

2027

المتميزون

سلسلة التفوق الدراسي — نجتهد لنوفق

ملزمة تأسيس الرياضيات

من الصفر للتمكن — حساب · جبر · هندسة · إحداثيات · مثلثات

محتويات الملزمة

٧-٣	الوحدة صفر: صندوق الأدوات — عمليات وكسور ونسب	٠
١٤-٨	الوحدة صفر: مساحات وتحولات وآلة حاسبة + اختبار	٠
١٥	الوحدة الأولى: أساسيات الحساب — شرح	١
١٦	الوحدة الأولى: تدريبات (مباشر · متوسط)	١
١٧	الوحدة الأولى: تدريبات (متقدم · اختيار) + اختبار	١
١٨	الوحدة الثانية: أساسيات الجبر — شرح	٢
٢٠-١٩	الوحدة الثانية: تدريبات + اختبار	٢
٢١	ملحق: جبر متقدم (تجميع، قانون عام، نظام معادلتين)	٢
٢٢	ملحق: إكمال المربع (المربع الكامل)	٢
٢٥-٢٣	ملحق: نظام معادلتين وثلاث معادلات	٢
٢٦	الوحدة الثالثة: الهندسة الأساسية — شرح ورسومات	٣
٢٨-٢٧	الوحدة الثالثة: تدريبات + اختبار	٣
٢٩	الوحدة الرابعة: الهندسة التحليلية — شرح ورسومات	٤
٣١-٣٠	الوحدة الرابعة: تدريبات + اختبار	٤
٣٢	الوحدة الخامسة: حساب المثلثات — شرح ورسومات	٥
٣٤-٣٣	الوحدة الخامسة: تدريبات + اختبار	٥
٣٦-٣٥	ملخص القوانين الشامل	٦
٣٧	أهم الأخطاء الشائعة — خلاصة كل الوحدات	٦
٣٨	الخرائط الذهنية للوحدات (٠ إلى ٥)	٧
٤٠-٣٩	بنك الأسئلة النهائي (اختيار من متعدد)	٨
٤١	بنك الأسئلة النهائي (مقالي ومسائل شاملة)	٨
٤٢	مفتاح إجابات بنك الأسئلة النهائي	٩
٤٦-٤٣	بنك الأسئلة الشامل — ٥٠ ● اختيار من متعدد	١١
٤٨-٤٧	بنك الأسئلة الشامل — ٣٠ ● أسئلة مباشرة	١١
٤٩	بنك الأسئلة الشامل — ٢٠ ● مستوى أعلى	١١
٥١-٥٠	مفتاح إجابات بنك الأسئلة الشامل (١٠٠ سؤال)	١١
٥٢	هل أنت جاهز للثانوي؟ — تحدي ختامي (٢٥ سؤال)	١٠

نجتهد لنوفق — الملزمة دي بتسد فجوات الأساسيات قبل الرياضيات المتقدمة

إزاي تذاكر بالملزمة دي؟

الفكرة

كل درس في الملزمة ماشي بنفس الترتيب الي مدرسك بيشرح بيه في الحصة، مش سرد قوانين بس. اتبع الترتيب ده في كل وحدة وهتلاقي نفسك بتفكر بدون حفظ.

💡 **ببساطة:** فكرة الدرس في جملتين قبل أي قانون.

🔥 **ليه ومتى نستخدمه:** إمتى هتحتاج القانون ده فعلاً في الامتحان.

🔍 **إزاي أعرفه في السؤال:** العلامات الي تدل إن السؤال عايز القانون ده بالذات.

🔥 **أمثلة محلولة:** سهل ← متوسط ← أصعب قليلاً، بالخطوات كاملة.

🧠 **كيف أفكر؟:** تدريب على اكتشاف الفكرة مش حفظ القانون.

⚠️ **أخطاء شائعة:** أشهر الأخطاء الي بيقع فيها زمايلك — تجنبها بقصد.

🔥 **تدريبات متدرجة:** مباشر ← متوسط ← متقدم ← اختيار من متعدد.

✅ **اختبار الوحدة:** حلّه بعد ما تخلص الدرس من غير ما تشوف الحل.

⚠️ تنبيه

الرموز الي هتقابلها طول الملزمة: **س** بدل x ، **ص** بدل y ، **أ** بدل a ، **ب** بدل b ، **م** بدل m ، **ن** بدل n — نفس صياغة المنهج المصري بالضبط.

ابدأ بالوحدة صفر دلوقتي، ومتستعجلش — الفهم قبل السرعة ★

المتميزون — ملزمة تأسيس الرياضيات

مندوق الأدوات الرياضية

الوحدة صفر — مراجعة شاملة لكل اللي درسته في الابتدائي والإعدادي

ليه وحدة صفر؟

قبل ما ندخل في رياضيات الثانوية، لازم «عدة الشغل» بتاعتك تبقى جاهزة. الوحدة دي مش هتعلمك حاجة جديدة — هي هتفتح اللي اتعلمته زمان وهتخليه في إيدك جاهز أي وقت، من غير ما تحس إنك «نسيت» حاجة.

محتويات الوحدة

- العمليات الأساسية وترتيبها
- الكسور بكل أنواعها
- النسبة والتناسب
- النسبة المئوية والربح والخسارة
- قوانين المساحات والمحيطات والحجوم
- تحويل الوحدات
- السرعة والزمن والمسافة، والكثافة
- استخدام الآلة الحاسبة العلمية Casio

إزاي تذاكر الوحدة دي؟

ذاكرها بسرعة وبدون ضغط — هي مراجعة مش درس جديد. لو لقيت نفسك فاكر حاجة، اقفز للي بعدها. لو لقيت حاجة ناسيها خالص، افتكرها كويس هنا، عشان هتستخدمها في كل وحدات الملزمة اللي جايه.



الأدوات الأربعة اللي هتستخدمها طول الملزمة

كل درس هنا مبني بنفس ترتيب باقي الملزمة: فكرة، قانون، أمثلة، تدريبات، إجابات

العمليات الأساسية وترتيبها

جمع · طرح · ضرب · قسمة · ترتيب العمليات (أوجا)

ببساطة

لما يبقى في السؤال أكثر من عملية حسابية مع بعض، فيه ترتيب ثابت لازم تمشي عليه — مش هتحتسب من اليمين للشمال عادي كده.

ليه ومتي؟ / إزاي أعرفه؟

هتستخدم ترتيب العمليات في كل مسألة فيها أكثر من عملية. لو شفت سؤال فيه أقواس، وقوى، وضرب، وجمع كلهم مع بعض — لازم تعرف مين يتحسب الأول.

الترتيب: (الأقواس) ← الأسس والجذور ← الضرب والقسمة (من اليمين لليسار) ← الجمع والطرح (من اليمين لليسار)

مثال سهل احسب: $4 \times 3 + 2$ الضرب الأول: $12 = 4 \times 3$ ، ثم الجمع: $14 = 12 + 2$ ✓ (لو جمعنا الأول قبل الضرب هيطلع غلط: $20 = 4 \times 5$)سؤال مشابه احسب: $1 \times 2 + 0$

جرب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

$$1 \times 2 + 0 = 2$$

مثال متوسط احسب: $0 - 3 \times (2 + 4)$ الأقواس الأول: $6 = 2 + 4$ ، ثم $18 = 3 \times 6$ ، ثم الطرح: $18 - 0 = 18$ ✓سؤال مشابه احسب: $2 + 0 \times (3 - 7)$

جرب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

$$22 = 2 + 0 \times (4) = 2$$

مثال يشبه الامتحانات احسب: $1 - (2 \div 8) + 3^2$ الأقواس: $8 \div 2 = 4$ ، الأس: $3^2 = 9$ ، ثم: $1 - 4 + 9 = 6$ ✓ (الأس والقوس مالهمش أولوية على بعض، احسب كل واحد في مكانه بترتيبه)سؤال مشابه احسب: $2 - (4 \div 12) + 3^3$

جرب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

$$9 = 2 - 3 + 8 = 7$$

كيف أفكر؟

افتكر كلمة «أوجا»: أقواس ← وأسس وجذور ← جمع وضرب وقسمة (الضرب والقسمة الأول) ← الجمع والطرح آخر حاجة. لو السؤال فيه قوس، ابدأ بيه دايقا مهما كان مكانه.

أخطاء يقع فيها الطلاب

- خطأ: $14 = 12 + 2$ — الصحيح: الضرب الأول: $12 = 4 \times 3$ ، $20 = 4 \times 5$
- خطأ: تجاهل القوس والحساب بالترتيب العادي — الصحيح: الي جوه القوس دايقا الأول
- خطأ: 3^2 يعني $2 \times 3 = 6$ — الصحيح: 3^2 يعني $3 \times 3 = 9$

تريخة: الجمع والطرح مع بعض «سوا سوا» بيتحسبوا من اليمين للشمال، مش الجمع الأول دايقا.

تريخة: اكتب فوق كل عملية رقم ترتيبها الأول قبل ما تبدأ تحسب، كده مش هتخطئ.

تدريبات: العمليات الأساسية

تدريب مباشر

(١) احسب: $3 \times 2 + 4$

(٢) احسب: $2 \times (1 + 5)$

(٣) احسب: $3 + 4 \div 12$

(٤) احسب: $4 \times 2 + 3 \times 2$

(٥) احسب: $2 \times 4 - 20$

تدريب متوسط

(١) احسب: $0 + 3 \div (3 - 9)$

(٢) احسب: $1 - 2 \times 3 + 2^2$

(٣) احسب: $(2 \div 4) - (2 \times 3) + 5$

(٤) احسب: $0 \div 2(2 - 7)$

(٥) احسب: $2 \div (1 - 4) \times 6$

تدريب متقدم

(١) احسب: $0 - [(2 \div 6) + 4] \times 3$

(٢) احسب: $0 \times 2 - 2(3 + 2)$

(٣) احسب: $2 \times (3 + 2) \div 40$

اختيار من متعدد

(١) $3 \times 2 + 6 = ?$

(ب) ١٢

(أ) ٢٤

(د) ٨

(ج) ١١

(٢) $3 \times (2 + 4) = ?$

(ب) ١٨

(أ) ١٤

(د) ٢٤

(ج) ١٠

(٣) $2 \div 4 \div 24 = ?$

(ب) ٣

(أ) ١٢

(د) ٤٨

(ج) ٦

(٤) $10 - 5^2 = ?$

(ب) ٢٥

(أ) ١٥

(د) ٥

(ج) ١٠٠

(٥) أول خطوة في حل $2^2 \times (1 + 3)$ هي:

(ب) نحسب اللي في القوس

(أ) نحسب 2^2 (د) نجمع $1 + 3$ (ج) نضرب 2×1

أسئلة تفكير

(١) ليه $(3+2)^2$ مش بتساوي 3^2+2^2 وضح بمثال رقمي.

(٢) اكتب سؤال حسابي بنفسك فيه ٤ عمليات مختلفة واحسبه.

(٣) لو نسيت ترتيب العمليات في الامتحان، إزاي تتأكد من إجابتك بطريقة ثانية؟

المباشر: (١-٢٠) (٢-١٢) (٣-٦) (٤-١٤) (٥-١٢) | المتوسط: (١-٧) (٢-٩) (٣-٩) (٤-٥) (٥-٩) | المتقدم: (١-١٦) (٢-١٥) (٣-١٦) | الاختيار من متعدد: (١-٣) (٢-٤) (٣-٥) | تفكير: (١) $20 = (3+2)^2$ بينما $13 = 3^2 + 2^2$ ، مختلفين لأن التربيع يشمل حد الضرب المتقاطع 2×3 (٢-٣) إجابة حرة، تأكد إن الطالب طبق الترتيب صح (٣-٥) اتبع «أوجا» خطوة خطوة وأعد الحساب من الأول

الكسور

جمع · طرح · ضرب · قسمة · تحويل لعدد عشري

ببساطة

الكسر يبقولك حاجة اتقسمت كام قسم، وإحنا عندنا كام قسم منها. البسط فوق (الي عندنا)، والمقام تحت (كل الأقسام).

ليه ومتي؟ / إزاي أعرفه؟

الكسور هتقابلك في كل حاجة: نسب، معادلات، هندسة تحليلية، مثلثات. لو السؤال فيه علامة «/» أو كتب «نصف، ثلث، ربع» ده كسر.

جمع/طرح: لازم نفس المقام (وحد المقامات) · ضرب: بسط × بسط ÷ مقام × مقام · قسمة: اقلب الكسر الثاني واضرب

مثال سهل احسب: $1/4 + 1/4$ نفس المقام، نجمع البسط بس: $1/2 = 2/4 = 1/2$ (بسط الناتج لو ينفع)سؤال مشابه احسب: $1/5 + 2/5$

جرب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

 $3/5 =$ مثال متوسط احسب: $1/4 + 1/3$ وحد المقام (م.م.أ. = 12): $3/12 + 4/12 = 7/12$ (اضرب البسط في نفس العدد الي ضربنا بيه المقام)سؤال مشابه احسب: $1/5 + 1/2$

جرب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

 $7/10 = 2/10 + 5/10 =$ مثال يشبه الامتحانات احسب: $1/2 \times 2/3 \div 3/4$ اقلب أول كسر بعد القسمة واضرب: $3/4 \times 3/2 \times 1/2 = 9/16$ (نقذ من اليمين لليسا، الضرب والقسمة بنفس المرتبة)سؤال مشابه احسب: $3/4 \times 1/2 \div 2/3$

جرب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

 $1 = 3/4 \times 2/1 \times 2/3 =$

كيف أفكر؟

شفت «÷» بين كسرين؟ اقلب الكسر الي بعد علامة القسمة فورًا واحولها لضرب. القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه، دايقًا وأبداً.

أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: $1/2 + 1/3 = 2/5$ (جمع البسط والمقام كده) — الصح: لازم توحد المقام الأول $5/6$
- خطأ: قسمة كسرين بضرب مباشر — الصح: اقلب الكسر الثاني ثم اضرب
- خطأ: 1 ونص = $1/2$ — الصح: 1 ونص = $3/2$ (اضرب الصحيح في المقام واجمع البسط)

تريكة: نصف = $1/2$ ، ربع = $1/4$ ، ثلث = $1/3$ ، — احفظهم غيبًا، هيوافروا وقت في الامتحان.

تريكة: عايز تحول كسر لعدد عشري بسرعة؟ اقسّم البسط على المقام مباشرة بالتلة الحاسبة.

تدريبات: الكسور

تدريب مباشر

(١) احسب: $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$

(٢) احسب: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$

(٣) احسب: $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$

(٤) احسب: $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

(٥) حول $\frac{3}{4}$ لعدد عشري

تدريب متوسط

(١) احسب: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

(٢) احسب: $\frac{2}{3} - \frac{1}{4}$

(٣) احسب: $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7}$

(٤) احسب: 2 ونص + ربع (حولهم لكسور أولًا)

(٥) احسب: $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$

تدريب متقدم

(١) احسب: $\frac{1}{6} \div (\frac{1}{3} + \frac{1}{2})$

(٢) احسب: $(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}) \times \frac{2}{3}$

(٣) وعاء به $\frac{3}{4}$ لتر ماء، أخذنا منه $\frac{1}{3}$ لتر — كام باقي؟

اختيار من متعدد

(١) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = ?$

(ب) $\frac{1}{2}$

(أ) $\frac{2}{8}$

(د) $\frac{2}{4}$

(ج) $\frac{1}{4}$

(٢) $\frac{2}{3} \div \frac{1}{3} = ?$

(ب) ٢

(أ) $\frac{2}{9}$

(د) $\frac{1}{2}$

(ج) ٦

(٣) $\frac{1}{2}$ من $\frac{1}{3} = ?$

(ب) $\frac{1}{5}$

(أ) $\frac{1}{6}$

(د) $\frac{1}{2}$

(ج) $\frac{2}{3}$

(٤) $0.5 = \text{أي كسر؟}$

(ب) $\frac{1}{2}$

(أ) $\frac{1}{4}$

(د) $\frac{2}{5}$

(ج) $\frac{1}{5}$

(٥) م.م.أ. لـ ٣ و٤ هو:

(ب) ١

(أ) ٧

(د) ٢٤

(ج) ١٢

أسئلة تفكير

(١) ليه لازم نوحد المقام قبل الجمع أو الطرح ومش لازم في الضرب؟

(٢) اشرح بكلامك ليه القسمة على كسر بتكبر الناتج أحيانًا.

(٣) قسم بيتزا على ٣ أصحاب بالتساوي، وكل واحد أكل $\frac{2}{5}$ من نصيبه — كام أكل كل واحد من البيتزا كلها؟

المباشر: (١) $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{5}{5} = 1$ (٢) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ (٣) $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (٤) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = 2$ (٥) حول $\frac{3}{4}$ لعدد عشري: $\frac{3}{4} = 0.75$ (٦) المتوسط: (١) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ (٢) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ (٣) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ (٤) $\frac{1}{2} \div (\frac{1}{3} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} \div \frac{7}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{12}{7} = \frac{6}{7}$ (٥) وعاء به $\frac{3}{4}$ لتر ماء، أخذنا منه $\frac{1}{3}$ لتر — كام باقي؟ $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$ (٦) الاختيار من متعدد: (١) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (٢) $\frac{2}{3} \div \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{1} = 2$ (٣) $\frac{1}{2}$ من $\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (٤) $0.5 = \frac{1}{2}$ (٥) م.م.أ. لـ ٣ و٤ هو: ١٢ (٦) التفكير: (١) ليه لازم نوحد المقام قبل الجمع أو الطرح ومش لازم في الضرب؟ (٢) اشرح بكلامك ليه القسمة على كسر بتكبر الناتج أحيانًا. (٣) قسم بيتزا على ٣ أصحاب بالتساوي، وكل واحد أكل $\frac{2}{5}$ من نصيبه — كام أكل كل واحد من البيتزا كلها؟

النسبة والتناسب والنسبة المئوية

النسبة - التناسب - الضرب التبادلي - الخضم والزيادة - الربح والخسارة

ببساطة

النسبة بتقارن بين حاجتين، والتناسب يقول إن نسبتين متساويتين. النسبة المئوية هي كسر مقامه ١٠٠ دائماً.

ليه ومتى؟ / إزاي أعرفه؟

هتستخدمها في مسائل الخلط، تكبير وتصغير الرسومات، حساب الخصومات والأرباح. لو شفت «نسبة»، «بالمئة %»، «تناسب»، أو كلمتين بينهم «:» — ده سؤال نسبة وتناسب.

أ : ب = ج : د ← أ × د = ب × ج (الضرب التبادلي) · النسبة المئوية = (الجزء ÷ الكل) × ١٠٠

مثال سهل إذا س : ٤ = ٦ : ٨ ، أوجد س

بالضرب التبادلي: س × ٨ = ٦ × ٤ = ٢٤ ، إذن س = ٢٤ ÷ ٨ = ٣ ✓

سؤال مشابه إذا س : ٥ = ٩ : ١٥ ، أوجد س

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

س × ١٥ = ٩ × ٥ = ٤٥ ، س = ٣

مثال متوسط سلعة سعرها ٤٠٠ جنيه، عليها خصم ١٥% — كام سعرها بعد الخصم؟

قيمة الخصم = ١٥% × ٤٠٠ = ٦٠ جنيه ، السعر بعد الخصم = ٤٠٠ - ٦٠ = ٣٤٠ جنيه ✓

سؤال مشابه سلعة سعرها ٦٠٠ جنيه، عليها خصم ٢٠% — كام سعرها بعد الخصم؟

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

الخصم = ٢٠% ، السعر = ٤٨٠ جنيه

مثال يشبه الامتحانات تاجر اشترى سلعة بـ ٥٠٠ جنيه وباعها بـ ٦٠٠ جنيه — أوجد نسبة الربح المئوية

الربح = ٦٠٠ - ٥٠٠ = ١٠٠ جنيه ، نسبة الربح = (الربح ÷ ثمن الشراء) × ١٠٠ = ١٠٠ × (١٠٠ ÷ ٥٠٠) = ٢٠% ✓ (النسبة دائماً بالنسبة لثمن الشراء مش البيع)

سؤال مشابه تاجر اشترى سلعة بـ ٨٠٠ جنيه وباعها بـ ٩٦٠ جنيه — أوجد نسبة الربح

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

الربح = ١٦٠ ، النسبة = (١٦٠ ÷ ٨٠٠) × ١٠٠ = ٢٠%

كيف أفكر؟

في مسائل الزيادة والخضم المتتالية (زاد ثم نقص، أو العكس)، لازم تحسب كل نسبة على السعر الجديد مش السعر الأصلي. متجقش النسب مع بعض أبداً.

أخطاء يقع فيها الطلاب

- خطأ: زيادة ٢٠% ثم نقص ٢٠% = السعر الأصلي — الصح: السعر بيتغير، لأن النسبة الثانية بتتسبب على رقم مختلف
- خطأ: نسبة الربح = (الربح ÷ ثمن البيع) × ١٠٠ — الصح: نسبة الربح = (الربح ÷ ثمن الشراء) × ١٠٠
- خطأ: في الضرب التبادلي: أ × ب = ج × د — الصح: أ : ب = ج : د تديك أ × د = ب × ج (الأطراف × الوسطين = الوسطين × الأطراف)

تريكة: ٢٠% من عدد = العدد ÷ ٥ (اختصار سريع بدون حاسبة).

تريكة: ١٠% من أي عدد = انقل الفاصلة العشرية خانة للييسار.

تدريبات: النسبة والتناسب والنسبة المئوية

تدريب مباشر

(١) أوجد ١٠% من ٢٥٠

(٢) أوجد ٥٠% من ٨٠

(٣) حوّل ٣٠% لكسر أبسط صورة

(٤) إذا س : ٣ = ٨ : ٦ ، أوجد س

(٥) سلعة بـ ٢٠٠ جنيه خصم ١٠% — كام السعر بعد الخصم؟

تدريب متوسط

(١) أوجد ٣٥% من ٢٤٠

(٢) نسبة ولد لبنت في فصل = ٣:٢ وعدد الفصل ٣٠ — كام عدد البنات؟

(٣) اشترى تاجر سلعة بـ ٣٠٠ جنيه وباعها بـ ٣٦٠ — أوجد نسبة الربح

(٤) سعر جهاز ٥٠٠ جنيه زاد ١٠% — كام سعره الجديد؟

(٥) إذا ٤٥ هي ١٥% من عدد، أوجد العدد

تدريب متقدم

(١) سلعة ٨٠٠ جنيه زادت ٢٠% ثم نقصت ١٠% من السعر الجديد — أوجد السعر النهائي

(٢) تاجر باع سلعة بخسارة ١٠% وكان ثمن شرائها ٤٠٠ جنيه — أوجد سعر البيع

(٣) في خلطة، نسبة السكر للدقيق ٢:٥ — لو استخدمنا ٤ كجم سكر، كام كجم دقيق نحتاج؟

اختيار من متعدد

(١) ٢٥% = أي كسر؟

(أ) ١/٢

(ب) ١/٣

(ج) ١/٤

(د) ١/٥

(٢) ٢٠% من ١٥٠ = ؟

(أ) ٣٠

(ب) ٢٠

(ج) ١٥

(د) ٤٥

(٣) إذا أ ب = ٢:٥ فإن أ = ؟

(أ) ٢

(ب) ٥

(ج) ب

(د) ١٠

(٤) نسبة الربح دايقا بحسب بالنسبة لـ

(أ) ثمن البيع

(ب) ثمن الشراء

(ج) الاثنين معا

(د) لا شيء مما سبق

(٥) زيادة ٥٠% على ٢٠٠ تعطي:

(أ) ٢٥٠

(ب) ٣٠٠

(ج) ٢٢٠

(د) ١٠٠

أسئلة تفكير

(١) ليه زيادة ١٠% ثم نقص ١٠% مش بترجعك لنفس السعر الأصلي؟ فسر بمثال.

(٢) هل ممكن نسبة الربح تكون أكبر من ١٠٠%؟ اشرح إزاي.

(٣) عندك خلطتين نسبهم مختلفة، إزاي تقارن أيهم أحلى (أكثر سكر بالنسبة للكل)؟

📌 المباشرة: (١) ٢٠% (٢) ٤٠% (٣) ٣٠% (٤) ٥٠% (٥) ١٨٠% (٦) ١٠٠% (٧) ١٢٠% (٨) ١٤٠% (٩) ١٦٠% (١٠) ١٨٠% (١١) ٢٠٠% (١٢) ٢٢٠% (١٣) ٢٤٠% (١٤) ٢٦٠% (١٥) ٢٨٠% (١٦) ٣٠٠% (١٧) ٣٢٠% (١٨) ٣٤٠% (١٩) ٣٦٠% (٢٠) ٣٨٠% (٢١) ٤٠٠% (٢٢) ٤٢٠% (٢٣) ٤٤٠% (٢٤) ٤٦٠% (٢٥) ٤٨٠% (٢٦) ٥٠٠% (٢٧) ٥٢٠% (٢٨) ٥٤٠% (٢٩) ٥٦٠% (٣٠) ٥٨٠% (٣١) ٦٠٠% (٣٢) ٦٢٠% (٣٣) ٦٤٠% (٣٤) ٦٦٠% (٣٥) ٦٨٠% (٣٦) ٧٠٠% (٣٧) ٧٢٠% (٣٨) ٧٤٠% (٣٩) ٧٦٠% (٤٠) ٧٨٠% (٤١) ٨٠٠% (٤٢) ٨٢٠% (٤٣) ٨٤٠% (٤٤) ٨٦٠% (٤٥) ٨٨٠% (٤٦) ٩٠٠% (٤٧) ٩٢٠% (٤٨) ٩٤٠% (٤٩) ٩٦٠% (٥٠) ٩٨٠% (٥١) ١٠٠٠% (٥٢) ١٠٢٠% (٥٣) ١٠٤٠% (٥٤) ١٠٦٠% (٥٥) ١٠٨٠% (٥٦) ١١٠٠% (٥٧) ١١٢٠% (٥٨) ١١٤٠% (٥٩) ١١٦٠% (٦٠) ١١٨٠% (٦١) ١٢٠٠% (٦٢) ١٢٢٠% (٦٣) ١٢٤٠% (٦٤) ١٢٦٠% (٦٥) ١٢٨٠% (٦٦) ١٣٠٠% (٦٧) ١٣٢٠% (٦٨) ١٣٤٠% (٦٩) ١٣٦٠% (٧٠) ١٣٨٠% (٧١) ١٤٠٠% (٧٢) ١٤٢٠% (٧٣) ١٤٤٠% (٧٤) ١٤٦٠% (٧٥) ١٤٨٠% (٧٦) ١٥٠٠% (٧٧) ١٥٢٠% (٧٨) ١٥٤٠% (٧٩) ١٥٦٠% (٨٠) ١٥٨٠% (٨١) ١٦٠٠% (٨٢) ١٦٢٠% (٨٣) ١٦٤٠% (٨٤) ١٦٦٠% (٨٥) ١٦٨٠% (٨٦) ١٧٠٠% (٨٧) ١٧٢٠% (٨٨) ١٧٤٠% (٨٩) ١٧٦٠% (٩٠) ١٧٨٠% (٩١) ١٨٠٠% (٩٢) ١٨٢٠% (٩٣) ١٨٤٠% (٩٤) ١٨٦٠% (٩٥) ١٨٨٠% (٩٦) ١٩٠٠% (٩٧) ١٩٢٠% (٩٨) ١٩٤٠% (٩٩) ١٩٦٠% (١٠٠) ١٩٨٠% (١٠١) ٢٠٠٠% (١٠٢) ٢٠٢٠% (١٠٣) ٢٠٤٠% (١٠٤) ٢٠٦٠% (١٠٥) ٢٠٨٠% (١٠٦) ٢١٠٠% (١٠٧) ٢١٢٠% (١٠٨) ٢١٤٠% (١٠٩) ٢١٦٠% (١١٠) ٢١٨٠% (١١١) ٢٢٠٠% (١١٢) ٢٢٢٠% (١١٣) ٢٢٤٠% (١١٤) ٢٢٦٠% (١١٥) ٢٢٨٠% (١١٦) ٢٣٠٠% (١١٧) ٢٣٢٠% (١١٨) ٢٣٤٠% (١١٩) ٢٣٦٠% (١٢٠) ٢٣٨٠% (١٢١) ٢٤٠٠% (١٢٢) ٢٤٢٠% (١٢٣) ٢٤٤٠% (١٢٤) ٢٤٦٠% (١٢٥) ٢٤٨٠% (١٢٦) ٢٥٠٠% (١٢٧) ٢٥٢٠% (١٢٨) ٢٥٤٠% (١٢٩) ٢٥٦٠% (١٣٠) ٢٥٨٠% (١٣١) ٢٦٠٠% (١٣٢) ٢٦٢٠% (١٣٣) ٢٦٤٠% (١٣٤) ٢٦٦٠% (١٣٥) ٢٦٨٠% (١٣٦) ٢٧٠٠% (١٣٧) ٢٧٢٠% (١٣٨) ٢٧٤٠% (١٣٩) ٢٧٦٠% (١٤٠) ٢٧٨٠% (١٤١) ٢٨٠٠% (١٤٢) ٢٨٢٠% (١٤٣) ٢٨٤٠% (١٤٤) ٢٨٦٠% (١٤٥) ٢٨٨٠% (١٤٦) ٢٩٠٠% (١٤٧) ٢٩٢٠% (١٤٨) ٢٩٤٠% (١٤٩) ٢٩٦٠% (١٥٠) ٢٩٨٠% (١٥١) ٣٠٠٠% (١٥٢) ٣٠٢٠% (١٥٣) ٣٠٤٠% (١٥٤) ٣٠٦٠% (١٥٥) ٣٠٨٠% (١٥٦) ٣١٠٠% (١٥٧) ٣١٢٠% (١٥٨) ٣١٤٠% (١٥٩) ٣١٦٠% (١٦٠) ٣١٨٠% (١٦١) ٣٢٠٠% (١٦٢) ٣٢٢٠% (١٦٣) ٣٢٤٠% (١٦٤) ٣٢٦٠% (١٦٥) ٣٢٨٠% (١٦٦) ٣٣٠٠% (١٦٧) ٣٣٢٠% (١٦٨) ٣٣٤٠% (١٦٩) ٣٣٦٠% (١٧٠) ٣٣٨٠% (١٧١) ٣٤٠٠% (١٧٢) ٣٤٢٠% (١٧٣) ٣٤٤٠% (١٧٤) ٣٤٦٠% (١٧٥) ٣٤٨٠% (١٧٦) ٣٥٠٠% (١٧٧) ٣٥٢٠% (١٧٨) ٣٥٤٠% (١٧٩) ٣٥٦٠% (١٨٠) ٣٥٨٠% (١٨١) ٣٦٠٠% (١٨٢) ٣٦٢٠% (١٨٣) ٣٦٤٠% (١٨٤) ٣٦٦٠% (١٨٥) ٣٦٨٠% (١٨٦) ٣٧٠٠% (١٨٧) ٣٧٢٠% (١٨٨) ٣٧٤٠% (١٨٩) ٣٧٦٠% (١٩٠) ٣٧٨٠% (١٩١) ٣٨٠٠% (١٩٢) ٣٨٢٠% (١٩٣) ٣٨٤٠% (١٩٤) ٣٨٦٠% (١٩٥) ٣٨٨٠% (١٩٦) ٣٩٠٠% (١٩٧) ٣٩٢٠% (١٩٨) ٣٩٤٠% (١٩٩) ٣٩٦٠% (٢٠٠) ٣٩٨٠% (٢٠١) ٤٠٠٠% (٢٠٢) ٤٠٢٠% (٢٠٣) ٤٠٤٠% (٢٠٤) ٤٠٦٠% (٢٠٥) ٤٠٨٠% (٢٠٦) ٤١٠٠% (٢٠٧) ٤١٢٠% (٢٠٨) ٤١٤٠% (٢٠٩) ٤١٦٠% (٢١٠) ٤١٨٠% (٢١١) ٤٢٠٠% (٢١٢) ٤٢٢٠% (٢١٣) ٤٢٤٠% (٢١٤) ٤٢٦٠% (٢١٥) ٤٢٨٠% (٢١٦) ٤٣٠٠% (٢١٧) ٤٣٢٠% (٢١٨) ٤٣٤٠% (٢١٩) ٤٣٦٠% (٢٢٠) ٤٣٨٠% (٢٢١) ٤٤٠٠% (٢٢٢) ٤٤٢٠% (٢٢٣) ٤٤٤٠% (٢٢٤) ٤٤٦٠% (٢٢٥) ٤٤٨٠% (٢٢٦) ٤٥٠٠% (٢٢٧) ٤٥٢٠% (٢٢٨) ٤٥٤٠% (٢٢٩) ٤٥٦٠% (٢٣٠) ٤٥٨٠% (٢٣١) ٤٦٠٠% (٢٣٢) ٤٦٢٠% (٢٣٣) ٤٦٤٠% (٢٣٤) ٤٦٦٠% (٢٣٥) ٤٦٨٠% (٢٣٦) ٤٧٠٠% (٢٣٧) ٤٧٢٠% (٢٣٨) ٤٧٤٠% (٢٣٩) ٤٧٦٠% (٢٤٠) ٤٧٨٠% (٢٤١) ٤٨٠٠% (٢٤٢) ٤٨٢٠% (٢٤٣) ٤٨٤٠% (٢٤٤) ٤٨٦٠% (٢٤٥) ٤٨٨٠% (٢٤٦) ٤٩٠٠% (٢٤٧) ٤٩٢٠% (٢٤٨) ٤٩٤٠% (٢٤٩) ٤٩٦٠% (٢٥٠) ٤٩٨٠% (٢٥١) ٥٠٠٠% (٢٥٢) ٥٠٢٠% (٢٥٣) ٥٠٤٠% (٢٥٤) ٥٠٦٠% (٢٥٥) ٥٠٨٠% (٢٥٦) ٥١٠٠% (٢٥٧) ٥١٢٠% (٢٥٨) ٥١٤٠% (٢٥٩) ٥١٦٠% (٢٦٠) ٥١٨٠% (٢٦١) ٥٢٠٠% (٢٦٢) ٥٢٢٠% (٢٦٣) ٥٢٤٠% (٢٦٤) ٥٢٦٠% (٢٦٥) ٥٢٨٠% (٢٦٦) ٥٣٠٠% (٢٦٧) ٥٣٢٠% (٢٦٨) ٥٣٤٠% (٢٦٩) ٥٣٦٠% (٢٧٠) ٥٣٨٠% (٢٧١) ٥٤٠٠% (٢٧٢) ٥٤٢٠% (٢٧٣) ٥٤٤٠% (٢٧٤) ٥٤٦٠% (٢٧٥) ٥٤٨٠% (٢٧٦) ٥٥٠٠% (٢٧٧) ٥٥٢٠% (٢٧٨) ٥٥٤٠% (٢٧٩) ٥٥٦٠% (٢٨٠) ٥٥٨٠% (٢٨١) ٥٦٠٠% (٢٨٢) ٥٦٢٠% (٢٨٣) ٥٦٤٠% (٢٨٤) ٥٦٦٠% (٢٨٥) ٥٦٨٠% (٢٨٦) ٥٧٠٠% (٢٨٧) ٥٧٢٠% (٢٨٨) ٥٧٤٠% (٢٨٩) ٥٧٦٠% (٢٩٠) ٥٧٨٠% (٢٩١) ٥٨٠٠% (٢٩٢) ٥٨٢٠% (٢٩٣) ٥٨٤٠% (٢٩٤) ٥٨٦٠% (٢٩٥) ٥٨٨٠% (٢٩٦) ٥٩٠٠% (٢٩٧) ٥٩٢٠% (٢٩٨) ٥٩٤٠% (٢٩٩) ٥٩٦٠% (٣٠٠) ٥٩٨٠% (٣٠١) ٦٠٠٠% (٣٠٢) ٦٠٢٠% (٣٠٣) ٦٠٤٠% (٣٠٤) ٦٠٦٠% (٣٠٥) ٦٠٨٠% (٣٠٦) ٦١٠٠% (٣٠٧) ٦١٢٠% (٣٠٨) ٦١٤٠% (٣٠٩) ٦١٦٠% (٣١٠) ٦١٨٠% (٣١١) ٦٢٠٠% (٣١٢) ٦٢٢٠% (٣١٣) ٦٢٤٠% (٣١٤) ٦٢٦٠% (٣١٥) ٦٢٨٠% (٣١٦) ٦٣٠٠% (٣١٧) ٦٣٢٠% (٣١٨) ٦٣٤٠% (٣١٩) ٦٣٦٠% (٣٢٠) ٦٣٨٠% (٣٢١) ٦٤٠٠% (٣٢٢) ٦٤٢٠% (٣٢٣) ٦٤٤٠% (٣٢٤) ٦٤٦٠% (٣٢٥) ٦٤٨٠% (٣٢٦) ٦٥٠٠% (٣٢٧) ٦٥٢٠% (٣٢٨) ٦٥٤٠% (٣٢٩) ٦٥٦٠% (٣٣٠) ٦٥٨٠% (٣٣١) ٦٦٠٠% (٣٣٢) ٦٦٢٠% (٣٣٣) ٦٦٤٠% (٣٣٤) ٦٦٦٠% (٣٣٥) ٦٦٨٠% (٣٣٦) ٦٧٠٠% (٣٣٧) ٦٧٢٠% (٣٣٨) ٦٧٤٠% (٣٣٩) ٦٧٦٠% (٣٤٠) ٦٧٨٠% (٣٤١) ٦٨٠٠% (٣٤٢) ٦٨٢٠% (٣٤٣) ٦٨٤٠% (٣٤٤) ٦٨٦٠% (٣٤٥) ٦٨٨٠% (٣٤٦) ٦٩٠٠% (٣٤٧) ٦٩٢٠% (٣٤٨) ٦٩٤٠% (٣٤٩) ٦٩٦٠% (٣٥٠) ٦٩٨٠% (٣٥١) ٧٠٠٠% (٣٥٢) ٧٠٢٠% (٣٥٣) ٧٠٤٠% (٣٥٤) ٧٠٦٠% (٣٥٥) ٧٠٨٠% (٣٥٦) ٧١٠٠% (٣٥٧) ٧١٢٠% (٣٥٨) ٧١٤٠% (٣٥٩) ٧١٦٠% (٣٦٠) ٧١٨٠% (٣٦١) ٧٢٠٠% (٣٦٢) ٧٢٢٠% (٣٦٣) ٧٢٤٠% (٣٦٤) ٧٢٦٠% (٣٦٥) ٧٢٨٠% (٣٦٦) ٧٣٠٠% (٣٦٧) ٧٣٢٠% (٣٦٨) ٧٣٤٠% (٣٦٩) ٧٣٦٠% (٣٧٠) ٧٣٨٠% (٣٧١) ٧٤٠٠% (٣٧٢) ٧٤٢٠% (٣٧٣) ٧٤٤٠% (٣٧٤) ٧٤٦٠% (٣٧٥) ٧٤٨٠% (٣٧٦) ٧٥٠٠% (٣٧٧) ٧٥٢٠% (٣٧٨) ٧٥٤٠% (٣٧٩) ٧٥٦٠% (٣٨٠) ٧٥٨٠% (٣٨١) ٧٦٠٠% (٣٨٢) ٧٦٢٠% (٣٨٣) ٧٦٤٠% (٣٨٤) ٧٦٦٠% (٣٨٥) ٧٦٨٠% (٣٨٦) ٧٧٠٠% (٣٨٧) ٧٧٢٠% (٣٨٨) ٧٧٤٠% (٣٨٩) ٧٧٦٠% (٣٩٠) ٧٧٨٠% (٣٩١) ٧٨٠٠% (٣٩٢) ٧٨٢٠% (٣٩٣) ٧٨٤٠% (٣٩٤) ٧٨٦٠% (٣٩٥) ٧٨٨٠% (٣٩٦) ٧٩٠٠% (٣٩٧) ٧٩٢٠% (٣٩٨) ٧٩٤٠% (٣٩٩) ٧٩٦٠% (٤٠٠) ٧٩٨٠% (٤٠١) ٨٠٠٠% (٤٠٢) ٨٠٢٠% (٤٠٣) ٨٠٤٠% (٤٠٤) ٨٠٦٠% (٤٠٥) ٨٠٨٠% (٤٠٦) ٨١٠٠% (٤٠٧) ٨١٢٠% (٤٠٨) ٨١٤٠% (٤٠٩) ٨١٦٠% (٤١٠) ٨١٨٠% (٤١١) ٨٢٠٠% (٤١٢) ٨٢٢٠% (٤١٣) ٨٢٤٠% (٤١٤) ٨٢٦٠% (٤١٥) ٨٢٨٠% (٤١٦) ٨٣٠٠% (٤١٧) ٨٣٢٠% (٤١٨) ٨٣٤٠% (٤١٩) ٨٣٦٠% (٤٢٠) ٨٣٨٠% (٤٢١) ٨٤٠٠% (٤٢٢) ٨٤٢٠% (٤٢٣) ٨٤٤٠% (٤٢٤) ٨٤٦٠% (٤٢٥) ٨٤٨٠% (٤٢٦) ٨٥٠٠% (٤٢٧) ٨٥٢٠% (٤٢٨) ٨٥٤٠% (٤٢٩) ٨٥٦٠% (٤٣٠) ٨٥٨٠% (٤٣١) ٨٦٠٠% (٤٣٢) ٨٦٢٠% (٤٣٣) ٨٦٤٠% (٤٣٤) ٨٦٦٠% (٤٣٥) ٨٦٨٠% (٤٣٦) ٨٧٠٠% (٤٣٧) ٨٧٢٠% (٤٣٨) ٨٧٤٠% (٤٣٩) ٨٧٦٠% (٤٤٠) ٨٧٨٠% (٤٤١) ٨٨٠٠% (٤٤٢) ٨٨٢٠% (٤٤٣) ٨٨٤٠% (٤٤٤) ٨٨٦٠% (٤٤٥) ٨٨٨٠% (٤٤٦) ٨٩٠٠% (٤٤٧) ٨٩٢٠% (٤٤٨) ٨٩٤٠% (٤٤٩) ٨٩٦٠% (٤٥٠) ٨٩٨٠% (٤٥١) ٩٠٠٠% (٤٥٢) ٩٠٢٠% (٤٥٣) ٩٠٤٠% (٤٥٤) ٩٠٦٠% (٤٥٥) ٩٠٨٠% (٤٥٦) ٩١٠٠% (٤٥٧) ٩١٢٠% (٤٥٨) ٩١٤٠% (٤٥٩) ٩١٦٠% (٤٦٠) ٩١٨٠% (٤٦١) ٩٢٠٠% (٤٦٢) ٩٢٢٠% (٤٦٣) ٩٢٤٠% (٤٦٤) ٩٢٦٠% (٤٦٥) ٩٢٨٠% (٤٦٦) ٩٣٠٠% (٤٦٧) ٩٣٢٠% (٤٦٨) ٩٣٤٠% (٤٦٩) ٩٣٦٠% (٤٧٠) ٩٣٨٠% (٤٧١) ٩٤٠٠% (٤٧٢) ٩٤٢٠% (٤٧٣) ٩٤٤٠% (٤٧٤) ٩٤٦٠% (٤٧٥) ٩٤٨٠% (٤٧٦) ٩٥٠٠% (٤٧٧) ٩٥٢٠% (٤٧٨) ٩٥٤٠% (٤٧٩) ٩٥٦٠% (٤٨٠) ٩٥٨٠% (٤٨١) ٩٦٠٠% (٤٨٢) ٩٦٢٠% (٤٨٣) ٩٦٤٠% (٤٨٤) ٩٦٦٠% (٤٨٥) ٩٦٨٠% (٤٨٦) ٩٧٠٠% (٤٨٧) ٩٧٢٠% (٤٨٨) ٩٧٤٠% (٤٨٩) ٩٧٦٠% (٤٩٠) ٩٧٨٠% (٤٩١) ٩٨٠٠% (٤٩٢) ٩٨٢٠% (٤٩٣) ٩٨٤٠% (٤٩٤) ٩٨٦٠% (٤٩٥) ٩٨٨٠% (٤٩٦) ٩٩٠٠% (٤٩٧) ٩٩٢٠% (٤٩٨) ٩٩٤٠% (٤٩٩) ٩٩٦٠% (٥٠٠) ٩٩٨٠% (٥٠١) ١٠٠٠٠% (٥٠٢) ١٠٠٢٠% (٥٠٣) ١٠٠٤٠% (٥٠٤) ١٠٠٦٠% (٥٠٥) ١٠٠٨٠% (٥٠٦) ١٠١٠٠% (٥٠٧) ١٠١٢٠% (٥٠٨) ١٠١٤٠% (٥٠٩) ١٠١٦٠% (٥١٠) ١٠١٨٠% (٥١١) ١٠٢٠٠% (٥١٢) ١٠٢٢٠% (٥١٣) ١٠٢٤٠% (٥١٤) ١٠٢٦٠% (٥١٥) ١٠٢٨٠% (٥١٦) ١٠٣٠٠% (٥١٧) ١٠٣٢٠% (٥١٨) ١٠٣٤٠% (٥١٩) ١٠٣٦٠% (٥٢٠) ١٠٣٨٠% (٥٢١) ١٠٤٠٠% (٥٢٢) ١٠٤٢٠% (٥٢٣) ١٠٤٤٠% (٥٢٤) ١٠٤٦٠% (٥٢٥) ١٠٤٨٠% (٥٢٦) ١٠٥٠٠% (٥٢٧) ١٠٥٢٠% (٥٢٨) ١٠٥٤٠% (٥٢٩) ١٠٥٦٠% (٥٣٠) ١٠٥٨٠% (٥٣١) ١٠٦٠٠% (٥٣٢) ١٠٦٢٠% (٥٣٣) ١٠٦٤٠% (٥٣٤) ١٠٦٦٠% (٥٣٥) ١٠٦٨٠% (٥٣٦) ١٠٧٠٠% (٥٣٧) ١٠٧٢٠% (٥٣٨) ١٠٧٤٠% (٥٣٩) ١٠٧٦٠% (٥٤٠) ١٠٧٨٠% (٥٤١) ١٠٨٠٠% (٥٤٢) ١٠٨٢٠% (٥٤٣) ١٠٨٤٠% (٥٤٤) ١٠٨٦٠% (٥٤٥) ١٠٨٨٠% (٥٤٦) ١٠٩٠٠% (٥٤٧) ١٠٩٢٠% (٥٤٨) ١٠٩٤٠% (٥٤٩) ١٠٩٦٠% (٥٥٠) ١٠٩٨٠% (٥٥١) ١١٠٠٠% (٥٥٢) ١١٠٢٠% (٥٥٣) ١١٠٤٠% (٥٥٤) ١١٠٦٠% (٥٥٥) ١١٠٨٠% (٥٥٦) ١١١٠٠% (٥٥٧) ١١١٢٠% (٥٥٨) ١١١٤٠% (٥٥٩) ١١١٦٠% (٥٦٠) ١١١٨٠% (٥٦١) ١١٢٠٠% (٥٦٢) ١١٢٢٠% (٥٦٣) ١١٢٤٠% (٥٦٤) ١١٢٦٠% (٥٦٥) ١١٢٨٠% (٥٦٦) ١١٣٠٠% (٥٦٧) ١١٣٢٠% (٥٦٨) ١١٣٤٠% (٥٦٩) ١١٣٦٠% (٥٧٠) ١١٣٨٠% (٥٧١) ١١٤٠٠% (٥٧٢) ١١٤٢٠% (٥٧٣) ١١

قوانين المساحات والمحيطات والحجوم

الأشكال المستوية والمجسمات الأساسية

ببساطة

المساحة = المكان الذي يشغله الشكل بواحد (وحدة²)، المحيط = طول الحدود حوالیه (وحدة)، الحجم = المكان الذي يشغله الجسم بواحد (وحدة³).

ليه ومتى؟ / إزاي أعرفه؟

هتستخدمها في كل مسائل الهندسة، والمسائل الحياتية زي حساب مساحة أرض أو حجم خزان. كلمة «مساحة» أو «مسطح» تدل على وحدة² وكلمة «حجم» تدل على وحدة³.

الشكل	المساحة	المحيط
المربع	الضلع ²	٤ × الضلع
المستطيل	الطول × العرض	٢ × (الطول + العرض)
المثلث	½ × القاعدة × الارتفاع	مجموع الأضلاع الثلاثة
متوازي الأضلاع	القاعدة × الارتفاع	٢ × (الضلعين المتجاورين)
شبه المنحرف	½ × (القاعدتين) × الارتفاع	مجموع الأضلاع الأربعة
الدائرة	ط × نق ²	٢ × ط × نق

حجم المكعب = الضلع³ · حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع · حجم الأسطوانة = ط × نق² × الارتفاع

مثال سهل مستطيل طوله ٨ سم وعرضه ٥ سم — أوجد مساحته ومحيطه

المساحة = ٥ × ٨ = ٤٠ سم²، المحيط = ٢ × (٥ + ٨) = ٢٦ سم ✓

سؤال مشابه مستطيل طوله ١٢ سم وعرضه ٦ سم — أوجد مساحته ومحيطه

جذب لوحك الأول... ثم شوف الحل ↓

المساحة = ٧٢ سم²، المحيط = ٣٦ سم

مثال متوسط دائرة نصف قطرها ٧ سم (ط = ٢٢/٧) — أوجد مساحتها ومحيطها

المساحة = ٢٢/٧ × ٧² = ٢٢ × ٧ = ١٥٤ سم²، المحيط = ٧ × ٢٢/٧ × ٢ = ٤٤ سم ✓ (٧² يبسط مع المقام ٧ في المساحة)

سؤال مشابه دائرة نصف قطرها ١٤ سم (ط = ٢٢/٧) — أوجد مساحتها ومحيطها

جذب لوحك الأول... ثم شوف الحل ↓

المساحة = ٦١٦ سم²، المحيط = ٨٨ سم

مثال يشبه الامتحانات صندوق متوازي مستطيلات طوله ٥ سم وعرضه ٤ سم وارتفاعه ٣ سم — أوجد حجمه

الحجم = الطول × العرض × الارتفاع = ٣ × ٤ × ٥ = ٦٠ سم³ ✓

سؤال مشابه صندوق طوله ٦ سم وعرضه ٥ سم وارتفاعه ٤ سم — أوجد حجمه

جذب لوحك الأول... ثم شوف الحل ↓

الحجم = ١٢٠ سم³ = ٤ × ٥ × ٦

كيف أفكر؟

لو السؤال بيديك ثلاث أبعاد (طول، عرض، ارتفاع) ففكر «حجم» فوزا. لو بيديك إثنين بس (طول وعرض، أو قاعدة وارتفاع) ففكر «مساحة». لو بيديك «حواليه» أو «سور» ففكر «محيط».

أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: مساحة الدائرة = ط × نق² (ده قانون المحيط) — الصحيح: مساحة الدائرة = ط × نق²
- خطأ: مساحة المثلث = القاعدة × الارتفاع — الصحيح: مساحة المثلث = ½ × القاعدة × الارتفاع
- خطأ: نسيان وحدة القياس (سم² للمساحة، سم³ للحجم) — الصحيح: اكتب الوحدة الصحيحة دايما في الإجابة النهائية



ط × نق²

مساحة الدائرة



طول × عرض

مساحة المستطيل

تريكة: شبه المنحرف = مستطيل + مثلث(ات). لو نسيت القانون قسمه لأشكال أسهل.

تريكة: استخدم ط = ٢٢/٧ لو نصف القطر مضاعف ٧، واستخدم ط = ٣.١٤ في باقي الحالات.

تدريبات: المساحات والمحيطات والحجوم

تدريب مباشر

- ١) مربع طول ضلعه ٦ سم — أوجد مساحته ومحيطه
- ٢) مثلث قاعدته ١٠ سم وارتفاعه ٤ سم — أوجد مساحته
- ٣) مستطيل طوله ٩ سم وعرضه ٣ سم — أوجد مساحته
- ٤) مكعب طول ضلعه ٣ سم — أوجد حجمه
- ٥) دائرة نق=٤ اسم (ط=٢٢/٧) — أوجد محيطها

تدريب متوسط

- ١) متوازي أضلاع قاعدته ١٢ سم وارتفاعه ٥ سم — أوجد مساحته
- ٢) شبه منحرف قاعدته ٦ سم و١٠ سم وارتفاعه ٤ سم — أوجد مساحته
- ٣) دائرة نق=٧ سم (ط=٢٢/٧) — أوجد مساحتها
- ٤) متوازي مستطيلات أبعاده ٧×٤×٣ سم — أوجد حجمه
- ٥) أسطوانة نق قاعدتها ٧ سم وارتفاعها ١٠ سم (ط=٢٢/٧) — أوجد حجمها

تدريب متقدم

- ١) أرض مستطيلة طولها ٢٠ م وعرضها ١٥ م، أراد صاحبها إحاطتها بسور — كام طول السور؟
- ٢) خزان مكعب الشكل طول ضلعه ٢ م — كام لتر ماء يسع (١م^٣=١٠٠٠ لتر)؟
- ٣) دائرة محيطها ٤٤ سم (ط=٢٢/٧) — أوجد مساحتها

اختيار من متعدد

١) مساحة مربع ضلعه ٥ سم = ؟

- أ) ١٠ سم^٢ ب) ٢٠ سم^٢
- ج) ٢٥ سم^٢ د) ١٥ سم^٢

٢) محيط دائرة نق=٧ (ط=٢٢/٧) = ؟

- أ) ٢٢ سم ب) ٤٤ سم
- ج) ١٥٤ سم د) ٧٧ سم

٣) حجم مكعب ضلعه ٤ سم = ؟

- أ) ١٦ سم^٣ ب) ٢٤ سم^٣
- ج) ٤٨ سم^٣ د) ٦٤ سم^٣

٤) مساحة مثلث قاعدته ٨ وارتفاعه ٥ = ؟

- أ) ٤٠ ب) ٢٠
- ج) ١٣ د) ٨٠

٥) وحدة قياس الحجم هي:

- أ) وحدة ب) وحدة^٢
- ج) وحدة^٣ د) لا وحدة له

أسئلة تفكير

- ١) لو ضاعفت طول ضلع المربع، هل مساحته ستتضاعف ولا بتزيد أكثر؟ فسر.
- ٢) اشرح إزاي تشتق قانون مساحة شبه المنحرف من قانون مساحة المثلث والمستطيل.
- ٣) صندوقين لهما نفس الحجم لكن أشكال مختلفة، هل يبقى لهم نفس المساحة الجانبية؟

📌 المباشرة: ١) مساحة=٣٦ سم^٢، محيط=٢٤ سم (٢٠ سم^٢، ٢٠ سم^٢، ٣٠ سم^٢، ٤٠ سم^٢، ٥٠ سم^٢، ٨٨ سم | المتوسط: ١) ٦٠ سم^٢، ٣٢ سم^٢، ١٥٤ سم^٢، ٨٤ سم^٣، ١٥٤ سم^٣ | المتقدم: ١) ٧٠ م، ٢٠ لتر، ٨٠٠ لتر، ١٥٤ سم^٢ | الاختيار من متعدد: ا) ٣ د ب ٣ د ب ٥ ج | تفكير: ١) بتزيد بمربع النسبة، لو ضاعفت الضلع المساحة بتبقى ٤ أمثال (٢٠) شبه المنحرف ممكن نقسمه لمثلث ومستطيل ونجمع مساحتهم، وده بيدينا نفس القانون العام (٣٠) لا مش بالضرورة، الشكل بيأثر على المساحة الجانبية حتى لو الحجم واحد

تحويل الوحدات، السرعة والكثافة

الطول والمساحة والحجم · السرعة والزمن والمسافة · الكثافة

ببساطة

تحويل الوحدات معناه إننا بنعبر عن نفس القيمة بوحدة قياس ثانية. السرعة بتربط بين المسافة والزمن، والكثافة بتربط بين الكتلة والحجم.

ليه ومتي؟ / إزاي أعرفه؟

هتستخدمها في مسائل الحركة والفيزياء التطبيقية جوه الرياضيات، وفي أي سؤال بيديك وحدة قياس ويطلب منك وحدة ثانية.

من	إلى	اضرب في
مم	سم	10 ÷
سم	م	100 ÷
م	كم	1000 ÷
سم ²	م ²	10000 ÷
سم ³	م ³	1000000 ÷
كم/ساعة	م/ثانية	3.6 ÷

السرعة = المسافة ÷ الزمن · المسافة = السرعة × الزمن · الزمن = المسافة ÷ السرعة · الكثافة = الكتلة ÷ الحجم

مثال سهل سيارة قطعت ١٨٠ كم في ٣ ساعات — أوجد سرعتها

السرعة = المسافة ÷ الزمن = ١٨٠ ÷ ٣ = ٦٠ كم/ساعة ✓

سؤال مشابه قطار قطع ٢٤٠ كم في ٤ ساعات — أوجد سرعته

جذب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

٢٤٠ ÷ ٤ = ٦٠ كم/ساعة

مثال متوسط حول ٧٢ كم/ساعة إلى م/ثانية

اقسم على ٣.٦: ٧٢ ÷ ٣.٦ = ٢٠ م/ثانية ✓ (أو: ٧٢ × ١٠٠٠ ÷ ٣٦٠٠ = ٢٠ م/ثانية)

سؤال مشابه حول ١٠٨ كم/ساعة إلى م/ثانية

جذب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

١٠٨ ÷ ٣.٦ = ٣٠ م/ثانية

مثال يشبه الامتحانات جسم كتلته ٥٠ كجم وحجمه ٢٥ م^٣ — أوجد كثافته

الكثافة = الكتلة ÷ الحجم = ٥٠ ÷ ٢٥ = ٢ كجم/م^٣ ✓

سؤال مشابه جسم كتلته ٨٠ كجم وحجمه ٢٠ م^٣ — أوجد كثافته

جذب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

٨٠ ÷ ٢٠ = ٤ كجم/م^٣

كيف أفكر؟

في مسائل السرعة، ارسم دايفاً مثلث صغير: المسافة فوق، السرعة والزمن تحت. غطي اللي عايز توجده وشوف العلاقة بين الاثنين الباقيين (ضرب لو جنب بعض، قسمة لو فوق وتحت).

أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: تحويل كم/ساعة لم/ثانية بالضرب في ٣.٦ — الصح: لازم تقسم على ٣.٦ (العكس بالعكس بيبقى ضرب)
- خطأ: نسيان تحويل الوحدات لنفس النظام قبل الحساب — الصح: تأكد إن كل الوحدات متوافقة قبل ما تطبق أي قانون
- خطأ: الكثافة = الحجم ÷ الكتلة — الصح: الكثافة = الكتلة ÷ الحجم

تريكة: لو نسيات اتجاه القسمة في التحويل، فخر: الوحدة الأكبر (كم) بتدي رقم أصغر من الوحدة الأصغر (م).

تريكة: كم/ساعة ÷ م/ث بالقسمة على ٣.٦ مباشرة، والعكس بالضرب في ٣.٦.

مهارات الآلة الحاسبة العلمية Casio

ببساطة

الآلة الحاسبة صايبك في الامتحان، بس لازم تعرف تستخدمها صح، لأنها مش هتفهملك قصدك — لازم تدخل الأرقام بالترتيب الصح.

أهم الأزرار اللي محتاجها

- القوى (x^y أو x^y): لحساب 4^3 اكتب: ٣ ثم زر القوة ثم ٤ ثم =
- الجذور ($\sqrt{x}$): لحساب الجذر التربيعي لـ ٤٩، دوس زر $\sqrt{x}$ ثم ٤٩ ثم =
- الكسور ($a/b/c$): بتدخل البسط والمقام في خانتين منفصلتين، والآلة بترجعك الناتج كسر مبسط
- النسبة المئوية (%): لحساب ١٥% من ٢٠٠ اكتب: ٢٠٠ $\times$ ١٥ % =
- الذاكرة (MR): M+ تخزين رقم، MR تسرجعه — مفيدة في المسائل الطويلة
- الأقواس () : استخدمها زي ما هي مكتوبة بالظبط في السؤال عشان الترتيب يبقى صح

أخطاء يقع فيها الطلاب

- خطأ: حساب 3^2 بدون قوس فيتطلع ٩ — **الصح:** لو عايز $(3-)^2$ لازم تحط قوس حوالين $3-$ في الآلة
- خطأ: نسيان تصفير الآلة (AC) قبل سؤال جديد — **الصح:** دوس AC دايمًا قبل أي مسألة جديدة

تريخة: اتمرن على الآلة بيتك كل يوم بسؤال أو اثنين، عشان تبقى سريع فيها وقت الامتحان.

تريخة: جرب زر SHIFT + = في الآلة عشان تحوّل الناتج من كسر لعدد عشري والعكس بسرعة.

تدريبات ختامية على الوحدة صفر

تدريب مباشر

- ١) حوّل ٥٠٠ سم إلى متر
- ٢) سيارة سرعتها ٨٠ كم/ساعة، كام تقطع في ٢ ساعة؟
- ٣) جسم كتلته ١٠ كجم وحجمه ٥ م^٣ — أوجد كثافته

تدريب متوسط

- ١) حوّل ٩٠ كم/ساعة إلى م/ثانية
- ٢) دراجة قطعت ٤٥ كم في ١,٥ ساعة — أوجد سرعتها

تدريب متقدم

- ١) قطار سرعتة ١٠٨ كم/ساعة، كام يقطع في ٤٥ ثانية؟ (حوّل السرعة أولًا)

اختيار من متعدد

١) اسم ؟ م

أ) ١	ب) ١٠
ج) ١٠٠	د) ١٠٠٠

٢) السرعة ؟

أ) الزمن ÷ المسافة	ب) المسافة ÷ الزمن
ج) المسافة × الزمن	د) المسافة ÷ الزمن

٣) وحدة الكثافة الشائعة:

أ) كجم/م ^٣	ب) م/ث
ج) كجم فقط	د) م ^٣ فقط

📌 المباشرة: ١) ٥٠ م ÷ ٢٠ كجم (٣٠ كجم/م^٣ | المتوسط: ١) ٢٥ م/ثانية (٢٠ كجم/ساعة | المتقدم: ١) السرعة = ٣,٦ ÷ ١,٨ = ٣ م/ث، المسافة = ٣ × ٤٥ = ١٣٥ م | الاختيار من متعدد: أ) ٣ ب) ١٣

اختبار الوحدة صفر - صندوق الأدوات

٢) $1/6 + 1/3 = ?$

(ب) ٢/٩

(أ) ١/٢

(د) ٢/٦

(ج) ١/٩

١) $2 \times 3 + 4 = ?$

(أ) ١٤

(ب) ١٠

(ج) ٩

(د) ١١

٤) مساحة دائرة نق=٧ (ط=٢٢/٧) = ؟

(ب) ٢٢سم^٢

(أ) ٤٤سم^٢

(د) ٤٩سم^٢

(ج) ١٥٤سم^٢

٣) ١٥% من ٢٠٠ = ؟

(أ) ٢٠

(ب) ٣٠

(ج) ١٥

(د) ٤٠

٦) ٢ كم = ؟ م

(ب) ٢٠٠

(أ) ٢٠

(د) ٢٠٠٠

(ج) ٢٠٠٠

٥) حجم مكعب ضلعه ٥ سم = ؟

(أ) ١٥سم^٣

(ب) ٢٥سم^٣

(ج) ١٠٠سم^٣

(د) ١٢٥سم^٣

٨) إذا س:٥ = ١٠:٦ فإن س = ؟

(ب) ٤

(أ) ٣

(د) ٦

(ج) ٥

٧) السرعة = ٦٠ كم/ساعة، الزمن=٢ ساعة، المسافة = ؟

(أ) ٣٠ كم

(ب) ٦٢ كم

(ج) ١٢٠ كم

(د) ٦٠ كم

١٠) الكثافة = ؟

(ب) الكتلة×الحجم

(أ) الحجم÷الكتلة

(د) الحجم فقط

(ج) الكتلة÷الحجم

٩) نسبة الربح = (الربح ÷ ؟) × ١٠٠

(أ) ثمن البيع

(ب) ثمن الشراء

(ج) الناتج

(د) المجموع

مراجعة سريعة (٥) وتحدي الأبطال (٣)

مراجعة: (٢+٦) × ٣ ÷ ٥ + ٢/٥ ÷ ٢٠% من ١٥٠ ÷ محيط مربع ضلعه ٧ سم ÷ حجم متوازي مستطيلات ٤ × ٣ × ٢

تحدي الأبطال: سلعة ١٠٠٠ جنيه خصم ١٠% ثم زيادة ٥% على السعر الجديد — السعر النهائي؟

تحدي الأبطال: دائرة محيطها ٣١,٤ سم (ط=٣,١٤) — أوجد نصف قطرها ثم مساحتها

تحدي الأبطال: قطار سرعته ٩٠ كم/ساعة قطع مسافة في ٣٠ دقيقة — كام المسافة بالكيلومتر؟

الاختبار: اب ٣ أ ب ٤ ج ٥ د ٦ ج ٧ أ ٨ ب ٩ ج ١٠ | المراجعة: ٢٤ ÷ ٣/٥ ÷ ٣٠٠ ÷ ٢٨ سم ٢٤٠ | تحدي الأبطال: ٩٤٥ جنيه ÷ نق=٥ سم، مساحة=٧٨,٥ سم^٢ ÷ ٤٥ كم

أساسيات الحساب

1

الإشارات - القوى والجذور - الكسور والنسبة المئوية
ببساطة

الحساب هو «عدة الشغل» يتاعتك في كل الرياضيات: إشارات وكسور ونسب وقوى — لو ضبطتهم، كل الباقي يبقى سهل.

ليه ومتى؟ / إزاي أعرفه؟

هتستخدم قواعد الإشارات والأسس في كل معادلة وتحليل هتقابله بعد كده. لو شفت أرقام سالبة، أو أسس فوق بعض، أو كسور جوه بعض في السؤال — ده معناه إنه سؤال حساب أساسي.

$$أ^m \times أ^n = أ^{(m+n)} \quad أ^m \div أ^n = أ^{(m-n)} \quad أ^m \times أ^n = أ^{(m \times n)} \quad أ^m \div أ^n = أ^{(m \div n)} \quad 1 = أ^0$$

مثال سهل: احسب: $(-3) \times (-4) + (-10) \div 2$

$$= 12 + (-5) = 7 \quad \checkmark \quad \text{(خطوة 1: نقذ الضرب والقسمة أولًا، خطوة 2: اجمع الناتجين)}$$

سؤال مشابه: احسب: $(-2) \times (-12) \div 3$

جذب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

$$= 10 + (-4) = 6$$

مثال متوسط: بسط: $2^3 \times 2^4 \div 2^5$

$$= 2^{(3+4-5)} = 2^2 = 4 \quad \checkmark \quad \text{(اجمع أسس الضرب، اطرح أسس القسمة، بنفس الترتيب)}$$

سؤال مشابه: بسط: $3^2 \times 3^5 \div 3^4$

جذب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

$$= 3^{(2+5-4)} = 3^3 = 27$$

مثال أصعب قليلًا: احسب: $(\frac{1}{2})^2 \times (-2)^3 + 3^0$

$$= 1 + 4 + 1 = 6 \quad \checkmark \quad \text{(الأس السالب يقلب الكسر، وأي عدد أسه صفر = 1)}$$

سؤال مشابه: احسب: $(\frac{1}{2})^2 \times (-2)^3 + 3^0$

جذب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓


$$= 1 + 9 + 1 = 10$$

كيف أفكر؟

لو شفت نفس الأسس متكرر في ضرب أو قسمة، فكر فورًا: «هجمّع/هطرح الأسس، مش هضربهم». مثال: شفت $5^3 \times 5^2 \rightarrow$ فكر $5^{(3+2)}$ مباشرة قبل أي حساب.

أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: $3^2 = 9$ — الصحيح: $3^2 = 9$ (التربيع على 3 فقط، أما $3^2 = 9$).
- خطأ: $0^0 = 0$ — الصحيح: $0^0 = 1$ لأي $0 \neq 0$.
- خطأ: قسمة كسرين بالقسمة المباشرة — الصحيح: اقلب الكسر الثاني واضرب



خط الأعداد: كل ما اتجهنا يمينًا زادت القيمة

تريكة: كم/ساعة ← م/ث بالقسمة على 3.6 مباشرة.

تريكة: 20% من عدد = العدد ÷ 5 (اختصار سريع بدون حاسبة).

تدريبات الوحدة الأولى (١)

● **تدریب مباشر**

$$\zeta = (O-) + (V-) (I$$

$$\tau = 0 \times (1 - \gamma)$$

$$\gamma = (0-) \div \Psi \cdot (\Psi$$

(٤) أوجد ١٠% من ٣٥٠

0) بسط: $\varepsilon^3 \div \varepsilon^5$

● تدريب متوسط

(۱) احسب: $^3(۲-) + ^2(۳-)$

(٢) بَسْط: $\mu^4 \div {}^3(\mu^2)$

(٣) أوجد ٤٥% من ٢٦٠

(٤) رتب تصاعديًا: -٤، -٢، -١، ٠، ١

(٥) بسّط الناتج: $\frac{1}{4} + \frac{2}{5}$

تذکیر

راجع صندوق «[أخطاء يقع فيها الطلاب](#)» في صفحة الشرح قبل ما تحل — وحاول متشوفش الحل غير بعد المحاولة.

[illegible]

تدريبات الوحدة الأولى (٢)

تدريب متقدم

(١) إذا $أ = ٤ - ب$ ، $٣ = احسب أ - ٢$ $أ ب + ب^٢$

(٢) بسط: $(٢ -)^٣ \times (١ -)^٥ \div (٤ -)$

(٣) احسب: $٣/٤ \div ٢/٣ \times ١/٢$

(٤) سلعة ٥٠٠ جنيه زادت ٢٠% ثم نقصت ١٠% من السعر الجديد — أوجد السعر النهائي

(٥) بسط: $٦^٥ \times (٢ -)^٦$

اختيار من متعدد

(١) ناتج $(٥ -) \times (٤ -) = ؟$

أ) ٢٠	ب) ٢٠ -
ج) ٩	د) ٩ -

(٢) $٥^٨ \times ؟ =$

أ) ١٠	ب) ١٦
ج) ٣٢	د) ٦٤

(٣) ١٥% من ٤٠٠ = ؟

أ) ٤٠	ب) ٤٥
ج) ٦٠	د) ٨٠

(٤) $٢^٩ - ؟ =$

أ) ١٦	ب) ١٦ -
ج) ٨	د) ٨ -

(٥) $٥/٦ - ١/٣ = ؟$

أ) ١/٢	ب) ١/٣
ج) ٢/٣	د) ٣/٦

اختبار الوحدة الأولى

(١) $(٨ -) + ٣ = ؟$

أ) ٥	ب) ٥ -
ج) ١١	د) ١١ -

(٢) $(١ -)^٨ \times ؟ =$

أ) ٣	ب) ٣ -
ج) ١/٣	د) ١/٣ -

(٣) ٦٠% من ١٢٠ = ؟

أ) ٦٠	ب) ٧٠
ج) ٧٢	د) ٨٠

(٤) ناتج $(٢ -) \times ٣ \times (١ -) = ؟$

أ) ٦	ب) ٦ -
ج) ٥	د) ٥ -

(٥) $٧^٥ = ؟$

أ) ٠	ب) ١
ج) ٧	د) غير معزف

(٦) $٢/٣ \times ٣/٤ = ؟$

أ) ١/٢	ب) ٦/١٢
ج) ٩/٨	د) ٢/٤

(٧) $١٠ - (٢ -) = ؟$

أ) ٥	ب) ٥ -
ج) ٨	د) ٨ -

(٨) $(٢^٣)^٢ = ؟$

أ) ١٦	ب) ٣٢
ج) ٦٤	د) ٨

(٩) أكبر عدد من: -٣، -٧، ٢٠ هو:

أ) ٣ -	ب) ٧ -
ج) ٠	د) ٢

(١٠) ٢٥% تساوي أي كسر؟

أ) ١/٢	ب) ١/٣
ج) ١/٤	د) ١/٥

مراجعة: $(-1) + (-9) \times (-4) - (0) \times 40$ من $200 \div 3^4 \times 3^2$ نصف + ربع

تحدي الأبطال: إذا $A = -2$ ، $B = 5$ أوجد $A^2 - B$

تحدي الأبطال: سعر جهاز ٨٠٠ جنيه، خصم ١٥% ثم ضريبة ١٠% على السعر بعد الخصم — السعر النهائي؟

تحدي الأبطال: بسط: $(2^{-1} + 3^{-1})$ بصورة كسر واحد

المتقدم: (١٠٤٩ - ٢٠٣٠) $(\frac{9}{16} \times 40) - 540$ جنيه ٢١٦ | الاختيار من متعدد: أ $2^3 \times 3^2$ ب 4^5 | اختبار الوحدة: ا ب $2^3 \times 3^2$ أ 4^5 ب $4^5 \times 3^2$ أ $4^5 \times 3^2$ ب $4^5 \times 3^2$ | المراجعة: ١٥ - ٢٠٣٠ $\frac{3}{4} \times 90 \times 80$ | تحدي الأبطال: ٣٠٣ ٧٤٨٠ جنيه ٥/٦٠

أساسيات الجبر

٢

المتطابقات - التحليل - المعادلات والمتباينات

ببساطة

الجبر لعبة «اختصارات»: نبسط المقادير، نحلل، ونحل معادلات — بنفس القواعد كل مرة، مفيش حفظ عشوائي.

إزاي أعرفه؟ / إزاي ومتي؟

لما تشوف حدين مربعين زي $(س+٣)^2$ أو فرق مربعات زي $س^2 - ٩$ ، أو معادلة فيها س، ده معناها إنك محتاج قوانين الجبر دي بالظبط.

$$س^2 = ٢(س+٣) + (س-٣)^2 = ٢(س+٣) + (س-٣)(س+٣) = (س+٣)^2$$

مثال سهل وشع: $(س+٤)^2$

$$س^2 + ٢(س)(٤) + ٤^2 = س^2 + ٨س + ١٦$$

سؤال مشابه وشع: $(س+٦)^2$

جرب لوحدة الأول... ثم شوف الحل

$$س^2 + ١٢س + ٣٦ =$$

مثال متوسط بشرط: $(س+٣) - (س-٣)(س+٣)$

$$س^2 + ٦س + ٩ - (س^2 - ٩) = س^2 + ٦س + ٩ - س^2 + ٩ = ١٨ + ١٨ = ٣٦$$

سؤال مشابه بشرط: $(س+٥) - (س-٥)(س+٥)$

جرب لوحدة الأول... ثم شوف الحل

$$س^2 + ١٠س + ٢٥ - (س^2 - ٢٥) = س^2 + ١٠س + ٥٠ =$$

مثال أصعب قليلاً إذا س + ١/س = ٣ ، أوجد س + ١/س

$$(س + ١/س)^2 = س^2 + ٢ + ١/س^2 = ٣^2 = ٩ \Rightarrow س^2 + ١/س^2 = ٩ - ٢ = ٧$$

سؤال مشابه إذا س + ١/س = ٤ ، أوجد س + ١/س

جرب لوحدة الأول... ثم شوف الحل

$$١٤ = ٢ - ٤^2 =$$

كيف أفكر؟

إزاي أعرف إن السؤال محتاج فرق مربعين؟ لو شفت: س - ٢٥ أو س٤ - ٩ فكر مباشرة في $(س-٥)(س+٥)$. العلامة: حدّين اثنين، إشارة سالبة بينهم، وكل حد تربيع كامل (جذره صحيح).

أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: $(س+٣)^2 = ٢(س+٣) + (س-٣)^2$ (ناقصك الحد الأوسط)
- خطأ: س - ٩ = (س-٣)(س+٣) — الصح: س - ٩ = (س-٣)(س+٣) (لازم تاخذ الجذر التربيعي لكل حد)
- خطأ: عند الضرب/القسمة على سالب في متباينة لا نغيّر الإشارة — الصح: لازم تعكس الإشارة

طريقة: معادلة درجة ثانية: دور عديدين حاصل ضربهم = الحد الثابت وجمعهم = معامل س بإشارته.

طريقة: فرق المربعين أسرع باب للتحليل — دور عليه أولاً قبل أي طريقة ثانية.

تدريبات الوحدة الثانية

تدريب مباشر

(١) بشرط: $٧س - ٣س + ٢$

(٢) وشع: $٢(س + ٢)$

(٣) حل: $س^٢ - ٤$

(٤) حل المعادلة: $س + ٥ = ١٢$

(٥) بشرط: $٣(س - ٢) + ٤$

تدريب متوسط

(١) حل: $٢(س - ٣) = ١٠$

(٢) حل: $س^٢ + ٥س + ٦$

(٣) وشع: $(س - ١)(س + ١)$

(٤) حل المتباينة: $-س + ٢ > ٨$ (احذر عكس الإشارة)

(٥) بشرط: $٢(س - ٤) + ٨س$

تدريب متقدم

(١) حل تحليلًا كاملاً: $س^٢ - ٨$

(٢) حل المعادلة: $س^٢ - ٧س + ١٢ = ٠$

(٣) إذا $س = ١$ / $س = ٤$ ، أوجد $س^٢ + ١ / س^٢$

(٤) بشرط: $(س + ٢)(س - ٢) - (س - ١)^٢$

(٥) حل: $٣(س + ١) - ٢ = ٢(س + ٤)$

اختيار من متعدد

(١) $(س - ٥)^٢ = ؟$

(أ) $س^٢ - ٥$

(ب) $س^٢ - ١٥س + ٢٥$

(ج) $س^٢ + ٢٥$

(د) $س^٢ - ٥س + ٢٥$

(٢) تحليل $س^٢ - ١ = ؟$

(أ) $(س - ١)(س + ١)$

(ب) $(س - ١)^٢$

(ج) $(س - ١)^٢$

(د) لا يُحلل

(٣) حل $٤س = ٢٠$ يعطي $س = ؟$

(أ) ٤

(ب) ٥

(ج) ٦

(د) ٨٠

(٤) جذرا المعادلة $س^٢ - س - ٦ = ٠$ هما:

(أ) ٣، ٢

(ب) ٣، ٢

(ج) ٢، ٣

(د) ٣، ٢

(٥) عند قسمة طرفي متباينة على -٣ فإن الإشارة:

(أ) تظل كما هي

(ب) تنعكس

(ج) تختفي

(د) تتضاعف

المباشر: (١) $٤س + ٢(س - ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٢) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٣) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٤) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٥) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٦) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٧) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٨) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (٩) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$ (١٠) $٢(س + ٢) - ٤(س + ٢) + ٣(س + ٢) - ٤(س + ٢) = ٥ - ٧س$

اختبار الوحدة الثانية

١ (أ+ب)² تساوي:

(أ) أ²+ب²

(ب) أ²+ب²+أب

(ج) أ²-ب²

(د) أ²ب

٢ س² - ١٦ = ؟

(أ) (س-٤)²

(ب) (س-٤)(س+٤)

(ج) (س+٤)²

(د) س(س-١٦)

٣ حل ٥ س - ٣ = ١٢ يعطي س = ؟

(أ) ٣

(ب) ٢

(ج) ٥

(د) ١٥

٤ بشرط ٤ س - (٢ - ٥) = ؟

(أ) ٥+س٢

(ب) ٥-س٢

(ج) ٥+س٦

(د) ٥-س٦

٥ عامل التحليل لـ س²+٧س+١٠ هما:

(أ) (س+٢)(س+٥)

(ب) (س+١)(س+١٠)

(ج) (س-٢)(س-٥)

(د) (س+٧)(س+١٠)

٦ (س-٧)(س+٧) = ؟

(أ) س²-٤٩

(ب) س²+٤٩

(ج) س²-١٤س

(د) س²+١٤س+٤٩

٧ حل المتباينة س - ٣ < ٢ يعطي:

(أ) س < ٥

(ب) س > ٥

(ج) س < ١

(د) س > ١

٨ الحد الناقص في (س+٤)² = س²+٨س+؟

(أ) ٤

(ب) ٨

(ج) ١٦

(د) ٣٢

٩ إذا ٢س+٩=١ فإن س = ؟

(أ) ٤

(ب) ٥

(ج) ٨

(د) ١٠

١٠ (٣-س)² تساوي:

(أ) س²-٩

(ب) س²-٩س+٩

(ج) س²+٩

(د) س²-٩س+٩

مراجعة سريعة (٥) وتحدي الأبطال (٣)

مراجعة: وسّع (س-٦)² · حلّ س²-٤٩ · حل ٣س=٢١ · بشرط ٥س-٢س+٤ · حل س-٤=١٠

تحدي الأبطال: حلّ تحليلًا كاملًا: س² - ١٢

تحدي الأبطال: إذا س+ص=٧ ، س-ص=٣ أوجد قيمتي س ، ص

تحدي الأبطال: حل المتباينة: -٣(س-١) ≤ ٦

اختبار الوحدة: اب ٢أ ٣أ ٤أ ٥أ ٦أ ٧أ ٨أ ٩أ اب | المراجعة: س²-١٢س+٣٦ · (س-٧)(س+٧) · س=٧ · س³+٤س=١٤ | تحدي الأبطال: ٣(س-٢) (س+٢) · س=٥، ص=٢ · س≥١

مهارات جبر متقدمة

٢

التحليل بالتجميع · القانون العام · نظام معادلتين مجهولين

ببساطة

مش كل معادلة أو مقدار يتحلل بالطرق البسيطة (فرق مربعين أو التربيع الكامل). أحياناً محتاج «تجميع» الحدود، أو معادلة الدرجة الثانية معندهاش تحليل سهل فنستخدم القانون العام. وأحياناً عندنا مجهولين مع بعض فمحتاجين نظام معادلتين.

ليه ومتى؟ / إزاي أعرفه؟

لو المقدار فيه ٤ حدود بدون عامل مشترك واحد للكل ← جِّب التجميع. لو معادلة الدرجة الثانية معاملاتهما مش بتديك تحليل صحيح ← استخدم القانون العام. لو عندك جملتين فيهم نفس المجهولين ← نظام معادلتين.

١) التحليل بالتجميع

جِّع كل حدين لهم عامل مشترك، طَّلِع العامل من كل مجموعة، ثم اطلع العامل المشترك الكبير

مثال محلول

حل: $س^٣ + س^٢ + ٣س + ٦$

جِّع: $(س^٣ + س^٢) + (٣س + ٦) = س^٢(س + ١) + ٣(س + ٢)$ (لاحظ إن (س+٢) اكرر في الاثنين، طَّلِع عامل مشترك)

سؤال مشابه

حل: $س^٣ + س^٢ + ٣س + ٦$

جِّب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

$س^٣ + س^٢ + ٣س + ٦ = (س + ٢)(س^٢ + ١)$

٢) حل معادلة الدرجة الثانية بالقانون العام

لو أس^٢ + بس + ج = ٠ ، فإن: $س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^٢ - ٤أج}}{٢أ}$

مثال محلول

حل: $س^٢ - ٥س + ٦ = ٠$ (بالقانون العام)

أ=٦، ب=-٥، ج=٦ المميز $= ب^٢ - ٤أج = ٢٥ - ٢٤ = ١$ ← $س = \frac{٥ \pm ١}{٢} = ٣$ أو $س = ٢$ ✓

سؤال مشابه

حل: $س^٢ - ٧س + ١٢ = ٠$ بالقانون العام

جِّب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

المميز $= ٤٩ - ٤٨ = ١$ ← $س = \frac{٧ \pm ١}{٢} = ٤$ أو $س = ٣$

مثال يشبه الامتحانات

حل: $س^٢ + ٣س - ٢ = ٠$

أ=٢، ب=٣، ج=-٢ المميز $= ٩ - ١٦ = -٧$ ← $س = \frac{-٣ \pm \sqrt{٩ - ١٦}}{٢} = \frac{-٣ \pm \sqrt{-٧}}{٢}$ ← $س = \frac{٣}{٢}$ أو $س = -٢$ ✓

سؤال مشابه

حل: $س^٢ + ٢س - ٦ = ٠$

جِّب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

المميز $= ٤٩ - ٤٨ = ١$ ← $س = \frac{٧ \pm ١}{٢} = ٤$ أو $س = ٣$ ✓

كيف أفكر؟

جِّب التحليل بالتخمين الأول (دور على عددين حاصل ضربهم = أ×ج ومجموعهم = ب). لو مش لاقى أرقام صحيحة بسهولة، استخدم القانون العام فوراً من غير ما تضيع وقت.

⚠ أخطاء يقع فيها الطلاب

- خطأ: نسيان الإشارة ± في القانون العام (بيكتب حل واحد بس) — **الصح:** لازم تحسب الحليْن: + و -
- خطأ: حساب المميز غلط بنسيان إشارة أ×ج — **الصح:** المميز $= ب^٢ - ٤أج$ ، انتبه للإشارات لو أ أو ج سالبين

تريخة: لو المميز (ب^٢-٤أج) سالب، المعادلة معندهاش حل حقيقي — متضيعش وقت في التخمين.

إكمال المربع — طريقة رابعة للحل والتحليل

💡 الفكرة

إكمال المربع معناه إننا نحول أي عبارة من الشكل $s^2 + bs$ إلى مربع كامل $(s + \frac{b}{2})^2$ عن طريق إضافة وطرح نفس المقدار — من غير ما نغير قيمة العبارة الأصلية.

🔗 القانون

لتحويل $s^2 + bs$ إلى مربع كامل: خذ نصف معامل s (يعني $b/2$)، رُبعه، واجمعه واطرحه:
 $s^2 + bs = (s + \frac{b}{2})^2 - (\frac{b}{2})^2$

🔍 **إمتى نستخدمها:** لما المعادلة صعب تتحلل بالتجميع أو بفرق مربعين، أو لما نحتاج نوجد أعلى/أقل قيمة لمقدار من الدرجة الثانية.

أمثلة محلولة

مثال ١ (سهل)

حوّل $s^2 + 6s$ إلى مربع كامل.الحل: نصف $6 = 3 \leftarrow 3^2 = 9 \leftarrow s^2 + 6s = (s + 3)^2 - 9$

🔄 حاول بنفسك

حوّل $s^2 + 8s$ إلى مربع كامل.فكر: نصف $8 = 4 \leftarrow$ رُبعهالإجابة: $(s + 4)^2 - 16$

مثال ٢ (متوسط)

حلّل $s^2 + 10s + 9$ بإكمال المربع.الحل: $s^2 + 10s + 9 = (s + 5)^2 - 25 + 9 = (s + 5)^2 - 16 = (s + 5)^2 - 4^2$ فبالتالي $s^2 + 10s + 9 = (s + 5)^2 - 16 = (s + 5)^2 - 4^2$

🔄 حاول بنفسك

حلّل $s^2 + 4s - 5$ بإكمال المربع.فكر: $(s + 2)^2 - 9$ الإجابة: $(s + 2)^2 - 9$

مثال ٣ (أصعب قليلاً)

حل المعادلة $s^2 - 6s + 5 = 0$ بإكمال المربع.الحل: $s^2 - 6s + 5 = (s - 3)^2 - 9 + 5 = (s - 3)^2 - 4 = 0 \leftarrow (s - 3)^2 = 4 \leftarrow s - 3 = \pm 2 \leftarrow s = 5 \text{ أو } s = 1$

🔄 حاول بنفسك

حل $s^2 - 2s - 8 = 0$ بإكمال المربع.فكر: $(s - 1)^2 - 9$ الإجابة: $s = 4 \text{ أو } s = -2$ ⚠️ خطأ شائع: نسيان طرح $(b/2)^2$ بعد إضافتها — لازم دائماً «نضيف ونطرح» في نفس الخطوة عشان القيمة الأصلية متتغيرش.

تريكة: إكمال المربع هو نفسه أساس اشتقاق القانون العام لحل معادلة الدرجة الثانية — لو فهمتها هتفهم القانون العام من غير حفظ.

حل نظام معادلتين بمجهولين

٢

طريقة الحذف · طريقة التعويض · مقدمة لثلاث معادلات

ببساطة

لما يكون عندك معادلتين ومجهولين (س و ص)، محتاج تلاقي قيمة كل واحد فيهم تحقق المعادلتين مع بعض في نفس الوقت.

طريقة الحذف (١)

اجعل معامل أحد المجهولين متساويًا (أو متضادًا) في المعادلتين، ثم اجمع أو اطرح لحذفه

مثال محلولة

حل: س + ص = ٧ ، س - ص = ٣

اجمع المعادلتين مباشرة (ص هتتلغي): $٢س = ١٠ \leftarrow س = ٥$ ، عوض في الأولى: $٥ + ص = ٧ \leftarrow ص = ٢$ ✓

سؤال مشابه

حل: س + ص = ١٠ ، س - ص = ٤

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

س=١٤ ← س=٧ ، ص=٣

مثال متوسط

حل: س + ص = ٨ ، س + ص = ٥

اطرح المعادلة الثانية من الأولى: س = ٣ ، عوض: $٣ + ص = ٥ \leftarrow ص = ٢$ ✓ (تأكد إن المجهول اللي هيتحذف له نفس المعامل بالضبط قبل الطرح)

سؤال مشابه

حل: س + ص = ١١ ، س + ص = ٥

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

اطرح: س=٦ ← س=٣ ، ص=٢

طريقة التعويض (٢)

اعزل مجهول من إحدى المعادلتين، وعوض بيه في المعادلة الثانية

مثال محلولة

حل: ص = س + ١ ، س + ٢ = ١٠

عوض ص في المعادلة الثانية: $س + ٢ = (س + ١) + ١٠ \leftarrow س = ٩ \leftarrow س = ٣$ ، $٣ + ٢ = ٥$ ✓

سؤال مشابه

حل: ص = س + ٢ ، س + ٢ = ٩

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

س+٢=٩ ← س=٣ ، ص=٦

كيف أفكر؟

لو أحد المجهولين معزول لوحده في إحدى المعادلتين (زي ص = ...) استخدم التعويض فوزًا. لو المعادلتين في نفس الصورة (س و ص في الاتنين) استخدم الحذف — أسرع.

⚠ أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: نسيان التعويض في المعادلة الأصلية لإيجاد المجهول الثاني — **الصح:** بعد ما توجد س، لازم **تعويض** عشان توجد ص
- خطأ: جمع المعادلتين بدل الطرح (أو العكس) — **الصح:** لو المعاملات **متضادة** (+ و -) اجمع، لو **متساوية** اطرح

تريكة: لو أحد المجهولين معزول (زي ص=...) استخدم التعويض فوزًا؛ لو الصورتين متشابهتين استخدم الحذف.

٢

مقدمة: ثلاث معادلات بثلاثة مجاهيل

نفس الفكرة نظام معادلتين، بس بمجهول إضافي
الفكرة

نفس الفكرة بالظبط، بس بدل معادلتين بنستخدم ٣ معادلات و ٣ مجاهيل (س، ص، ع). الخطوات: احذف مجهول واحد من معادلتين، ثم احذف نفس المجهول من معادلتين تانيين، كده هيبقى عندك معادلتين بمجهولين بس — وتحلهم بنفس طريقة الحذف أو التعويض اللي اتعلمتها.

مثال محلول

حل: س+ص=٥ ، ص+ع=٧ ، س+ع=٦

من المعادلة (١): س=٥-ص. عوّض في (٣): (٥-ص)+ع=٦ ⇒ ع-ص=١. مع المعادلة (٢) ص+ع=٧: اجمعهم (٨=ع٢) ⇒ ع=٨-ص ⇒ ص=٣ ⇒ س=٢ ✓

سؤال مشابه

حل: س+ص=٤ ، ص+ع=٩ ، س+ع=٧

جرب لوجدك الأول... ثم شوف الحل ↓

س=١ ، ص=٣ ، ع=٦

كيف أفكر؟

اختار المجهول اللي هيتحذف بسهولة. الهدف تقلّل ٣ مجاهيل لمجهولين بس، وبعدين تحل زي أي نظام معادلتين عادي.

⚠ أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: الاختفاء بحل معادلتين وتجاهل الثالثة — **الصح:** لازم تستخدم **الثلاث** معادلات عشان توجد الثلاث مجاهيل
- خطأ: نسيان التعويض النهائي لإيجاد آخر مجهول — **الصح:** بعد ما توجد مجهولين، عوّض في أي معادلة أصلية لتوجد الثالث

تريخة: إبدأ دايفاً بالمجهول اللي أسهل تحذفه (اللي معاملته ١ في أكثر من معادلة).

تدريبات: الجبر المتقدم

● **تدریب مباشر**

(ا) حل: $s + 1 = s$, $s - 2 = s$

(٢) حل بالقانون العام: $s^2 - 3s + 2 = 0$

(٣) حل: ص = س + ٢ ، س + ص = ٨

● **تدريب متوسط**

(١) حلّ بالتجميع: $s^3 + s^2\epsilon + s\Gamma + \Lambda$

حل: $I^3 = \Gamma + 3S$, $V = \Gamma + S$

(٣) حل بالقانون العام: $٢س^٢ - س - ٦ = ٠$

● تدريب متقدم

(١) حل: $\varepsilon = \text{ص} + \text{س}$, $\eta = \text{ع} + \text{ص}$, $\nu = \text{ع} + \text{س}$

(٢) حل بالقانون العام: $s^2 + 2s - 8 = 0$ ، وتحقق من الحل بالتحليل

اختيار من متعدد

١) في نظام معادلتين، طريقة الحذف تعتمد على:

أ) تساوی المعاملات

(ب) عزل مجهول

(ج) الرسم

(د) التخمين

٢) صيغة القانون العام هي:

أ) س = -ب / أ

$$(ب) \text{ س} = [-ب \pm \sqrt{ب^2 - 4أب}] \div 2أ$$

(ج) س = ب² - ٤أ

(د) س = أَج/ب

(٣) لو المميز = صفر، فإن المعادلة لها:

(أ) حِلَّانٌ مُخْتَلِفَانِ

(ب) حل واحد مكرر

ج) لال حل حقيقي

(د) لانهاية من الحلول

[illegible]

الهندسة الأساسية

٣

الزوايا · فيثاغورس · المساحات والمحيطات · الدائرة

ببساطة

الهندسة «عينك» في الرياضيات: زوايا ومثلثات ومساحات — الرسمة الصح بتحل نص المسألة قبل ما تكتب رقم واحد.

إزاي ومتى؟ / إزاي أعرفه؟

لو السؤال فيه مثلث قائم الزاوية ومطلوب ضلع ناقص ← فيثاغورس. لو فيه دائرة ومطلوب مساحة أو محيط ← قوانين الدائرة. لو فيه زاويتان على خط مستقيم أو زاويتان متجاورتان ← علاقات الزوايا.

احفظ

الزوايا: حادة: $0^\circ < 90^\circ$ قائمة: 90° منفرجة: $90^\circ < 180^\circ$ المتكاملتان مجموعها 90° والمتجاورتان على خط مجموعها 180° . مجموع زوايا المثلث = 180° .فيثاغورس: $ج^2 = س^2 + ص^2$ (ج الوتر) · مساحة المستطيل = $ط \times ع$ · مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times ق \times ع$ · مساحة الدائرة = $ط \times نق^2$ · محيط الدائرة = $2\pi \times نق$

مثال سهل مثلث قائم ضلعه ٣ ، ٤ — أوجد الوتر

$$ج^2 = 3^2 + 4^2 = 16 + 9 = 25 \leftarrow ج = \sqrt{25} = 5 \checkmark$$

سؤال مشابه مثلث قائم ضلعه ٦ ، ٨ — أوجد الوتر

جذب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

$$ج^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \leftarrow ج = 10$$

مثال متوسط مثلث قائم وتره ١٣ وأحد ضلعيه ٥ — أوجد الضلع الآخر

$$الضلع^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \leftarrow الضلع = \sqrt{144} = 12 \checkmark$$

سؤال مشابه مثلث قائم وتره ١٧ وأحد ضلعيه ٨ — أوجد الضلع الآخر

جذب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

$$الضلع^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225 \leftarrow الضلع = 15$$

مثال أصعب قليلًا مساحة دائرة = ١٥٤ سم^٢ (ط=٢٢/٧) — أوجد نصف القطر

$$١٥٤ = (٢٢/٧) \times نق^2 \leftarrow نق^2 = ١٥٤ \times ٧/٢٢ = ٤٩ \leftarrow نق = ٧ \text{ سم} \checkmark$$

سؤال مشابه مساحة دائرة = ٦١٦ سم^٢ (ط=٢٢/٧) — أوجد نصف القطر

جذب لوحدة الأول... ثم شوف الحل ↓

$$نق^2 = ٦١٦ \times ٧/٢٢ = ١٩٦ \leftarrow نق = ١٤ \text{ سم}$$

كيف أفكر؟


شفت مثلث فيه علامة الزاوية القائمة (المربع الصغير)؟ فكر فوزًا في فيثاغورس. شفت «أطول ضلع» في مثلث قائم؟ ده الوتر دايما — قدام الزاوية القائمة مباشرة.

أخطاء يقع فيها الطالب


- خطأ: استخدام فيثاغورس في أي مثلث — الصح: فيثاغورس للمثلث القائم فقط
- خطأ: اعتبار أي ضلع هو الوتر — الصح: الوتر هو أطول ضلع المقابل للزاوية القائمة
- خطأ: نسيان أن مجموع زوايا المثلث ثابت — الصح: دايما = 180° مهما كان شكل المثلث




أنواع الزوايا



الدائرة ونصف القطر



نظرية فيثاغورس



المثلث القائم الزاوية

تريكة: مساحة الدائرة بـ $٢٢/٧$ ← دؤر على مضاعفات ٧ في نق؟ عشان يبسط.

تريكة: ثلاثية (٣،٤،٥) و (٦،٨،١٠) و (٥،١٢،١٣) مثلثات قائمة جاهزة — احفظها توفر وقت.

تدريبات الوحدة الثالثة

تدريب مباشر

- ١) أوجد مكحلة زاوية 30°
- ٢) أوجد الزاوية المجاورة للزاوية 110° على خط مستقيم
- ٣) مساحة مثلث قاعدته 10 سم وارتفاعه 6 سم
- ٤) محيط دائرة نصف قطرها 14 سم ($\pi = 22/7$)
- ٥) مثلث قائم ضلعا 6 و 8 — أوجد الوتر

تدريب متوسط

- ١) مثلث قائم ضلعا 5 و 12 — أوجد الوتر
- ٢) زاويتان متكاملتان إحداهما 35° — أوجد الأخرى
- ٣) مساحة دائرة نصف قطرها 10 سم ($\pi = 3.14$)
- ٤) مثلث زواياه 50° ، 60° ، ؟ — أوجد الزاوية الثالثة
- ٥) مستطيل طوله 12 سم وعرضه 7 سم — أوجد المساحة والمحيط

تدريب متقدم

- ١) مساحة دائرة = 116 سم² — أوجد نصف قطرها ($\pi = 22/7$)
- ٢) مثلث قائم وتره 17 وأحد ضلعيه 8 — أوجد الضلع الآخر ثم مساحة المثلث
- ٣) زاويتان متجاورتان على خط مستقيم، إحداهما ضعف الأخرى — أوجد الزاويتين
- ٤) سلم طوله 10 أمتار مستند على حائط، قاعدته تبعد 6 أمتار عن الحائط — أوجد ارتفاع السلم على الحائط
- ٥) دائرة محيطها 44 سم — أوجد مساحتها ($\pi = 22/7$)

اختيار من متعدد

١) مجموع زوايا المثلث = ؟

- (أ) 90° (ب) 180°
- (ج) 270° (د) 360°

٢) مثلث قائم ضلعا 9 ، 12 — الوتر = ؟

- (أ) 15 (ب) 18
- (ج) 21 (د) 108

٣) مكحلة زاوية $60^\circ = ؟$

- (أ) 15° (ب) 25°
- (ج) 35° (د) 115°

٤) مساحة دائرة نصف قطرها 7 سم ($\pi = 22/7$) = ؟

- (أ) 44 (ب) 88
- (ج) 154 (د) 308

٥) زاوية قياسها 120° تُصنّف:

- (أ) حادة (ب) قائمة
- (ج) منفرجة (د) مستقيمة

📌 المباشرون: (١) 60° ، 70° ، 30° سم² ، 40° سم² ، 88 سم² ، 10 سم² | المتوسط: (١) 13° ، 50° ، 314 سم² ، 40° ، 70° ، 50° مساحه = 84 سم² ، محيط = 38 سم | المتقدم: (١) 14 سم ، 20 سم ، الضلع = 10 ، المساحة = 60 سم² ، 120° ، 40° ، 8 م ، 104 سم² | الاختيار من متعدد: (١) 32 ، 34 ، 5 ج

اختبار الوحدة الثالثة



١) مثلث قائم ضلعه ٣ ، ٤ — الوتر = ؟

(أ) ٥

(ب) ٦

(ج) ٧

(د) ١٢

٢) الزاوية القائمة تساوي:

(أ) ٤٥°

(ب) ٦٠°

(ج) ٩٠°

(د) ١٨٠°

٣) محيط دائرة نصف قطرها ٧ سم (ط=٢٢/٧) = ؟

(أ) ٢٢

(ب) ٣٥

(ج) ٤٤

(د) ١٥٤

٤) مساحة مثلث قاعدته ٨ وارتفاعه ٥ = ؟

(أ) ١٣

(ب) ٢٠

(ج) ٤٠

(د) ٨٠

٥) زاويتان متجاورتان على خط مستقيم مجموعهما:

(أ) ٩٠°

(ب) ١٨٠°

(ج) ٢٧٠°

(د) ٣٦٠°

٦) مثلث زواياه ٤٠°، ٧٠°، ؟

(أ) ٦٠°

(ب) ٧٠°

(ج) ٨٠°

(د) ٩٠°

٧) الوتر في المثلث القائم هو:

(أ) أقصر ضلع

(ب) أطول ضلع

(ج) أي ضلع

(د) الارتفاع

٨) مثلث قائم وتره ١٠ وأحد ضلعيه ٦ — الضلع الآخر = ؟

(أ) ٤

(ب) ٦

(ج) ٨

(د) ١٦

٩) مساحة مستطيل طوله ٩ وعرضه ٤ = ؟

(أ) ١٣

(ب) ٢٦

(ج) ٣٦

(د) ٤٥

١٠) زاوية حادة قياسها:

(أ) أقل من ٩٠°

(ب) تساوي ٩٠°

(ج) أكبر من ٩٠°

(د) تساوي ١٨٠°

مراجعة سريعة (٥) وتحدي الأبطال (٣)

مراجعة: مكفلة ٥٥° · مثلث قائم ٥، ١٢ الوتر؟ · مساحة دائرة نق=٣ (ط=٣.١٤) · مجموع زوايا الرباعي=؟ · مساحة مثلث قاعدته ٦ وارتفاعه ٩

تحدي الأبطال: مثلث قائم مساحته ٢٤ سم^٢ وأحد ضلعيه القائمين ٦ سم — أوجد الضلع الآخر ثم الوتر

تحدي الأبطال: دائرة نصف قطرها ٥ سم — أوجد الفرق بين مساحتها ومحيطها (ط=٣.١٤)

تحدي الأبطال: مثلث فيه زاوية = ضعف الثانية والثالثة = ٣٠° — أوجد الزاويتين الأخريين

📝 اختبار الوحدة: أ ١٢ ج ٣ ع ٥ ب ٦ د ٧ ب ٨ ج ٩ أ ١٠ | المراجعة: ٣٥° · ١٣٠ · ٢٨.٢٦ · ٣٦٠° · ٢٧٠ سم^٢ | تحدي الأبطال: الضلع=٨، الوتر=١٠ · الفرق=٤٧.١ سم^٢ · ١٠٠°، ٥٠°

الهندسة التحليلية

٤

المسافة · المنتصف · الميل · التوازي · التعامد

بساطة

بنحّول الرسم لأرقام: مسافة بين نقطتين، منتصف قطعة، وميل خط — ثلاث قوانين بس، وكل مسائل الوحدة دي دايرة حواليهم.

ليه ومتي؟ / إزاي أعرفه؟

لو السؤال بيديك إحداثيات نقطتين (س،ص) ومطلوب طول أو منتصف أو اتجاه الخط بينهم ← استخدم قوانين الهندسة التحليلية مباشرة من غير رسم.

$$م = (ص_2 - ص_1) / (س_2 - س_1) \cdot المسافة = \sqrt{((س_2 - س_1)^2 + (ص_2 - ص_1)^2)} \cdot \text{المنتصف} = ((س_1 + س_2) / 2, (ص_1 + ص_2) / 2)$$

مثال سهل أوجد ميل المستقيم المار بـ (١،٢) و (٣،٨)

$$م = (٨ - ٢) / (٣ - ١) = ٦ / ٢ = ٣$$

سؤال مشابه أوجد ميل المستقيم المار بـ (٢،٣) و (٤،١١)

جّزب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

$$م = (١١ - ٣) / (٤ - ٢) = ٨ / ٢ = ٤$$

مثال متوسط أوجد المسافة بين (٠،٠) و (٣،٤)

$$\text{المسافة} = \sqrt{(٤^2 + ٣^2)} = \sqrt{(١٦ + ٩)} = \sqrt{٢٥} = ٥$$

سؤال مشابه أوجد المسافة بين (٠،٠) و (٦،٨)

جّزب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓

$$\text{المسافة} = \sqrt{(٨^2 + ٦^2)} = \sqrt{١٠٠} = ١٠$$

مثال أصعب قليلًا النقطتان (١،٢) و (٥،١٠): أوجد المنتصف، ثم معادلة الخط

$$\text{المنتصف} = ((٥ + ١) / ٢, (١٠ + ٢) / ٢) = (٣, ٦). \text{الميل} = (١٠ - ٢) / (٥ - ١) = ٨ / ٤ = ٢. \text{المعادلة: } ص - ٢ = ٢(س - ١) \leftarrow ص = ٢س - ٢$$

سؤال مشابه النقطتان (٢،٣) و (٦،١١): أوجد المنتصف، ثم معادلة الخط

جّزب لوحدك الأول... ثم شوف الحل ↓


$$\text{المنتصف} = (٤, ٧). \text{الميل} = ٨ / ٤ = ٢. \text{المعادلة: } ص = ٢س - ١$$

كيف أفكر؟

شفت كلمة «متوازيان» في السؤال؟ فكّر: نفس الميل بالظبط. شفت «متعامدان»؟ فكّر: حاصل ضرب الميلين = -١. مفيش حاجة تالّة.

أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: عكس ترتيب الطرح في الميل — الصح: لازم نفس الترتيب في البسط والمقام (ص_٢ - ص_١ فوق، س_٢ - س_١ تحت)
- خطأ: نسيان الجذر التربيعي في قانون المسافة — الصح: المسافة = جذر مجموع مربعي الفروق
- خطأ: اعتبار التعامد يعني نفس الميل — الصح: التعامد يعني حاصل الضرب = -١



تريخة: ص = م س + ج ← «ج» هي نقطة تقاطع الخط مع محور الصادات.

تريخة: ميل موجب ↗ صعود · ميل سالب ↘ هبوط · ميل صفر ← خط أفقي.

تدريبات الوحدة الرابعة

تدريب مباشر

- ١) أوجد منتصف القطعة بين (٠,٠) و (٤,٦)
- ٢) أوجد ميل المستقيم المار بـ (١,١) و (٣,٥)
- ٣) أوجد المسافة بين (٠,٠) و (٦,٨)
- ٤) أوجد ميل المستقيم المار بـ (٢,٣) و (٢,٧)
- ٥) أوجد منتصف القطعة بين (٢,٤) و (٦,٠)

تدريب متوسط

- ١) اكتب معادلة خط ميله ٤ ويمر بـ (٠,١)
- ٢) أوجد المسافة بين (١,١) و (٤,٥)
- ٣) هل المستقيمان بميل ٣ و ٣ متوازيان أم متعامدان؟
- ٤) أوجد ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله ٢
- ٥) أوجد معادلة المستقيم المار بـ (٢,٣) وميله ١-

تدريب متقدم

- ١) أوجد طول أ ب حيث أ (٢,٣) ، ب (٦,٧)
- ٢) تحقق: هل النقاط (٠,٠)، (٢,٢)، (٤,٤) على استقامة واحدة؟
- ٣) أوجد معادلة المستقيم المار بمنتصف (٢,٤) و (٦,٨) وميله ٣
- ٤) مستقيمان متعامدان ميل أحدهما ٢/٣ — أوجد ميل الآخر
- ٥) أ (١,٢) ، ب (٥,٢) ، جـ (٥,٥) — أوجد نوع المثلث أ ب جـ (بيثاغورس)

اختيار من متعدد

١) منتصف (٢,٤) و (٦,٠) = ؟

- أ) (٤,٧) ب) (٨,١٤)
- ج) (٤,٦) د) (٢,٣)

٢) ميل المستقيم المار بـ (٠,٠) و (٢,٦) = ؟

- أ) ٢ ب) ٣
- ج) ٦ د) ١/٣

٣) مستقيمان متعامدان، ميل أحدهما ٢ — ميل الآخر = ؟

- أ) ٢ ب) ٢-
- ج) ١/٢- د) ١/٢

٤) المسافة بين (١,١) و (٤,٥) = ؟

- أ) ٣ ب) ٤
- ج) ٥ د) ٧

٥) خط ميله صفر يكون:

- أ) رأسي ب) أفقي
- ج) مائل د) غير معرّف

📌 المباشرة: ١) (٢,٣) ٢) (٣,٠) ٣) (٠,١) ٤) غير معرّف (خط رأسي) ٥) (٢,٢) | المتوسط: ١) ص=٤س+١ ٢) ٥ (٣٠ ٥ متوازيان ٣) ٠ ١/٢- (٤٠ ص=-س+٥ | المتقدم: ١) ٢٠ ٢/٤ (٢ نعم، على استقامة واحدة (نفس الميل=١) ٣) ص=٣س-٤٠ ٦- ٣/٢ (٥٠ مثلث قائم الزاوية | الاختيار من متعدد: أ) ٣ ب) ٢ ج) ٤ د) ٥

حساب المثلثات

0

النسب المثلثية · الزوايا الخاصة · العلاقة الأساسية

ببساطة

في المثلث القائم: كل نسبة مثلثية بتقسّم ضلعين على بعض — جا (المقابل/الوتر)، جتا (المجاور/الوتر)، ظا (المقابل/المجاور).

ليه ومتى؟ / إزاي أعرفه؟

لو السؤال فيه مثلث قائم وزاوية معلومة ومطلوب طول ضلع، أو العكس — استخدم النسبة المناسبة حسب الأضلاع المعطاة والمطلوبة.

1 = θ جتا + θ المقابل/المجاور · جا² = θ المجاور/الوتر · ظا = θ المقابل/الوتر · جتا = θ جا

احفظ

الزوايا الخاصة: جا $\theta = 30^\circ = 1/2$ · جتا $\theta = 30^\circ = \sqrt{3}/2$ · ظا $\theta = 30^\circ = 1/\sqrt{3}$ · جا $\theta = 45^\circ = \sqrt{2}/2$ · جتا $\theta = 45^\circ = \sqrt{2}/2$ · ظا $\theta = 45^\circ = 1$ · جا $\theta = 60^\circ = \sqrt{3}/2$ · جتا $\theta = 60^\circ = 1/2$ · ظا $\theta = 60^\circ = \sqrt{3}$.

مثال سهل

مثلث قائم: المقابل 3 والوتر 5 — أوجد جا، جتا، ظا

المجاور $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ ← جا = $3/5$ · جتا = $4/5$ · ظا = $3/4$ ✓

سؤال مشابه

مثلث قائم: المقابل 5 والوتر 13 — أوجد جا، جتا، ظا

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

المجاور $\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ ← جا = $5/13$ · جتا = $12/13$ · ظا = $5/12$

مثال متوسط

إذا جتا $\theta = 4/5$ = لزواوية حادة — أوجد جا θ جا $\theta^2 = 1 - \text{جتا}^2 \theta = 1 - 16/25 = 9/25$ ← جا $\theta = 3/5$ ✓

سؤال مشابه

إذا جتا $\theta = 12/13$ = لزواوية حادة — أوجد جا θ

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓

جا $\theta^2 = 1 - 144/169 = 25/169$ ← جا $\theta = 5/13$

مثال أصعب قليلاً

بسط: جا $\theta^2 + \text{جتا}^2 \theta + \text{ظا}^2 \theta = 45$ = $1 + 1 + 1 = 3$ ✓ (استخدم العلاقة الأساسية أولاً ثم عوّض قيمة الزاوية الخاصة)

سؤال مشابه

بسط: جا $\theta^2 + \text{جتا}^2 \theta + \text{ظا}^2 \theta = 30$

جرب لوحده الأول... ثم شوف الحل ↓


= $1 + (3/\sqrt{3})^2 + 1/3 = 4/3$

كيف أفكر؟

شفت «مقابل» و«وتر» في نفس السؤال؟ فحّر جا. شفت «مجاور» و«وتر»؟ فحّر جتا. شفت «مقابل» و«مجاور» من غير وتر؟ فحّر ظا مباشرة.

أخطاء يقع فيها الطالب

- خطأ: اعتبار جا أو جتا ممكن يزدوا عن 1 — **الصحيح**: قيمتهما بين 0 و 1 (لو طلعك جا = 0/4 اعرف إن فيه غلط)
- خطأ: الخلط بين المقابل والمجاور — **الصحيح**: المقابل قدام الزاوية مباشرة، والمجاور جنبها
- خطأ: نسيان أن ظا = جا/جتا — مفيد في التبسيط والتحقق



النسب المثلثية في المثلث القائم

تريكة: زاوية 30° قدامها الضلع الأصغر، وزاوية 60° قدامها الضلع الأوسط.

تريكة: «جا» مع «المقابل» و«جتا» مع «المجاور» — والوتر دايفاً تحت في الاثنين.

تدريبات الوحدة الخامسة

تدريب مباشر

(١) $\angle A = 40^\circ$

(٢) $\angle B = 60^\circ$

(٣) $\angle C = 90^\circ$

(٤) مثلث قائم: المجاور ٦ والوتر ١٠ — أوجد $\angle A$

(٥) $\angle A = 30^\circ + \angle B = 60^\circ$

تدريب متوسط

(١) إذا $\angle A = 40^\circ$ لمزاوية حادة — أوجد $\angle A$

(٢) مثلث قائم: المقابل ٥ والمجاور ١٢ — أوجد الوتر ثم $\angle A$

(٣) بسط: $\angle A = 30^\circ \times \angle B = 60^\circ + \angle C = 30^\circ \times \angle A = 60^\circ$

(٤) إذا $\angle A = 60^\circ = 1/2$ أوجد θ (زاوية خاصة)

(٥) بسط: $\angle A = 40^\circ \times \angle B = 40^\circ$

تدريب متقدم

(١) بسط: $\angle A = 20^\circ + \angle B = 40^\circ$

(٢) إذا $\angle A = 30^\circ$ (زاوية حادة) أوجد $\angle A$ و $\angle B$

(٣) برج ارتفاعه مجهول، زاوية الارتفاع من نقطة تبعد ٥٠ م $\angle A = 30^\circ$ — أوجد ارتفاع البرج (باستخدام $\angle A$)

(٤) أثبت أن: $(1 - \angle A) = \angle B$ باستخدام العلاقة الأساسية

(٥) بسط: $\angle A \times \angle B = \angle C$ (بدلالة $\angle A$ فقط)

اختيار من متعدد

(١) $\angle A = 30^\circ$ ؟

(أ) $1/2$	(ب) $3/2\sqrt{}$
(ج) ١	(د) $2/2\sqrt{}$

(٢) إذا $\angle A = 30^\circ$ (زاوية حادة) فإن $\angle B = ?$

(أ) $3/4$	(ب) $4/5$
(ج) $5/4$	(د) $4/3$

(٣) $\angle A = 60^\circ$ ؟

(أ) ١	(ب) $3\sqrt{}$
(ج) $3/3\sqrt{}$	(د) $1/2$

(٤) $\angle A = 40^\circ \times \angle B = 40^\circ$ ؟

(أ) ١	(ب) $1/2$
(ج) $2\sqrt{}$	(د) ٢

(٥) أقصى قيمة ممكنة لـ $\angle A$ هي:

(أ) ٠	(ب) $1/2$
(ج) ١	(د) ∞

المباشر: (١) $1/2$ (٢) $3/2$ (٣) $3/5$ (٤) $4/5$ (٥) $5/4$ | المتوسط: (١) $3/5$ (٢) $4/5$ (٣) $5/4$ (٤) $4/5$ (٥) $5/4$ | المتقدم: (١) $2/2$ (٢) $3/2$ (٣) $4/2$ (٤) $5/2$ (٥) $6/2$ | الاختيار من متعدد: أ ٢ ب ٣ ج ٥ د ٤

اختبار الوحدة الخامسة

(١) جتا ٣٠° = ؟

(أ) ١/٢

(ب) ٣/٢٧

(ج) ١

(د) ٢/٢٧

(٢) جا ٦٠° = ؟

(أ) ١/٢

(ب) ٣/٢٧

(ج) ١

(د) ٠

(٣) ظا ٣٠° = ؟

(أ) ١

(ب) ٣/٧

(ج) ٣/٣٧

(د) ١/٢

(٤) جتا ٣٠° + جتا ٦٠° = ؟

(أ) ٠

(ب) ١

(ج) ٢

(د) ٣

(٥) في المثلث القائم، جتا θ = ؟

(أ) مقابل/وتر

(ب) مجاور/وتر

(ج) مقابل/مجاور

(د) وتر/مجاور

(٦) جا ٩٠° = ؟

(أ) ٠

(ب) ١/٢

(ج) ١

(د) غير معرّف

(٧) إذا جتا θ = ١/٢ فإن θ (زاوية خاصة حادة) = ؟

(أ) ٣٠°

(ب) ٤٥°

(ج) ٦٠°

(د) ٩٠°

(٨) مثلث قائم: المقابل ٧ والوتر ٢٥ — المجاور = ؟

(أ) ١٨

(ب) ٢٤

(ج) ٣٢

(د) ١٧٥

(٩) ظا θ تساوي:

(أ) جا θ × جتا θ

(ب) جا θ ÷ جتا θ

(ج) جتا θ ÷ جا θ

(د) جا θ²

(١٠) جا ٤٥° = ؟

(أ) ١

(ب) ٢/٢٧

(ج) ٣/٢٧

(د) ١/٢

مراجعة سريعة (٥) وتحدي الأبطال (٣)

مراجعة: ظا ٥٠° · جا ٣٠° + جتا ٦٠° · إذا جا θ = ١/٢ أوجد جتا θ · جا ٦٠° × جتا ٣٠° · ظا ٣٠° × ظا ٦٠°

تحدي الأبطال: مثلث قائم زاويته ٦٠° وضلعه المجاور ٤ سم — أوجد المقابل والوتر

تحدي الأبطال: أثبت أن ظا ٣٠° × ظا ٦٠° = ١

تحدي الأبطال: طائرة ورقية خيطها ٥٠ م ويصنع زاوية ٤٥° مع الأرض — أوجد ارتفاعها تقريبًا

👉 اختبار الوحدة: اب ٣ ج ٤ ب ٥ ج ٦ ج ٧ ب ٨ ج ٩ ب ١٠ | المراجعة: ١٠١ · جتا θ = ٣/٢٧ · ٣/٤٠ | تحدي الأبطال: المقابل = ٣/٤، الوتر = ٨ · إثبات صحيح (١ =) ٣٥.٤٢ م

ملخص القوانين الشامل (١) – أساسيات صفر والحساب والجبر

٦

القانون	الموضوع
أقواس ← أسس وجذور ← ضرب وقسمة (يمين لشمال) ← جمع وطرح (يمين لشمال)	ترتيب العمليات
جمع/طرح: وخذ المقام · ضرب/بسط/بسط، مقام×مقام · قسمة: اقلب واضرب	الكسور
أ:ب=ج:د ← أ×د=ب×ج (الضرب التبادلي)	النسبة والتناسب
النسبة=% (الجزء÷الكل)×١٠٠ · نسبة الربح=(الربح÷ثمن الشراء)×١٠٠	النسبة المئوية والربح
مربع=ضلع ^٢ · مستطيل=ط×ع · مثلث=%ق×ع · دائرة=طنق ^٢ · مكعب=ضلع ^٣ · أسطوانة=طنق ^٢ ×ارتفاع	المساحات والحجوم
السرعة=المسافة÷الزمن · الكثافة=الكتلة÷الحجم · كم/ساعة÷٣,٦=ثانية	السرعة والكثافة
متشابهان ← موجب · مختلفان ← سالب · الجمع بإشارة الأكبر قيمة	الإشارات
$a^m \times a^n = a^{m+n}$ · $a^m \div a^n = a^{m-n}$ · $(a^m)^n = a^{m \times n}$ · $a^0 = 1$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	القوى
$\sqrt{a^2} = a $ · $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ (لأب≥٠)	الجذور
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	المتطابقات
عامل مشترك أولاً ← فرق مربعين ← ثلاثي حدود ← تجميع (للمقادير الرباعية)	التحليل
لو أس ^٢ +بس+ج=٠ فإن س= $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	القانون العام
حذف: وخذ المعامل واجمع/اطرح · تعويض: اعزل مجهول وعوض بيه	نظام معادلتين
اعزل س بنقل الحدود مع عكس الإشارة · الضرب/القسمة على سالب في متباينة ← اعكس الإشارة	المعادلات والمتباينات

نصيحة مذاكرة

غظي عمود «القانون» بإيدك وحاول تفتكره من عمود «الموضوع» بس — ده أسرع اختبار لنفسك قبل أي امتحان.

ملخص القوانين الشامل (٢) – الهندسة والإحداثيات والمثلثات

٦

القانون	الموضوع
مجموع زوايا المثلث ١٨٠° . المتكاملتان ٩٠° . المتجاورتان على خط ١٨٠°	الزوايا والمثلث
ج ^٢ = س ^٢ + ص ^٢ (ج هي الوتر، للمثلث القائم فقط)	فيثاغورس
مستطيل = ط × ع . مثلث = ½ × ع × دائرة = طنق ^٢ ومحيطها = ٢طنق	المساحات والمحيطات
المسافة = (فرق السينات ^٢ + فرق الصادات ^٢) . المنتصف = متوسط الإحداثيات . الميل = فرق الصادات / فرق السينات	الإحداثيات
توازي ← ميلان متساويان . تعامد ← حاصل ضرب الميلين = -١	التوازي والتعامد
ص = م س + ج (م الميل، ج نقطة تقاطع محور الصادات)	معادلة الخط
جا = مقابل / وتر . جتا = مجاور / وتر . ظا = مقابل / مجاور . جا ^٢ + جتا ^٢ = ١	النسب المثلثية
٣٠°، ٤٥°، ٦٠°، ٩٠° — راجع جدول القيم في الوحدة الخامسة	الزوايا الخاصة

نجاهد لنوفق — الأساس القوي بيخلي الرياضيات المتقدمة «تحصيل حاصل»

المتميزون — ملزمة تأسيس الرياضيات

أهم الأخطاء الشائعة – خلاصة كل الوحدات

٦

قبل أي امتحان

دي أخطر ١٠ أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية في الأساسيات، مجمعة من كل الوحدات في صفحة واحدة. راجعها في ٣ دقائق قبل أي اختبار وهتوفر عليك درجات كتير.

الوحدة	الخطأ الشائع ✗	المصح ✓
١ حساب	$9 = 3^2 -$	$-3^2 = 9$ (التربيع على ٣ فقط)
١ حساب	$٠.٨ =$ صفر	$٨ = ٠.٨$ لأي $\neq$ صفر
٢ جبر	$(أ+ب)^2 = أ^2+ب^2$	$أ^2+٢أب+ب^2$ (فاتك الحد الأوسط)
٢ جبر	$س^2-٩=(س-٩)(س+٩)$	$(س-٣)(س+٣)$ — خذ الجذر التربيعي لكل حد
٣ هندسة	فيثاغورس في أي مثلث	للمثلث القائم فقط
٣ هندسة	أي ضلع يُعتبر الوتر	الوتر هو أطول ضلع قدام الزاوية القائمة
٤ إحداثيات	عكس ترتيب الطرح في الميل	نفس الترتيب فوق وتحت (ص-ص ÷ س-س) (١)
٤ إحداثيات	التعامد = نفس الميل	التعامد = حاصل ضرب الميلين -١
٥ مثلثات	جا أو جتا ممكن < ١	قيمتهم بين ٠ و ١ دائماً
٥ مثلثات	الخط بين المقابل والمجاور	المقابل قدام الزاوية، المجاور جنبها

نصيحة

امتحانات الثانوية بتحب تحط الأخطاء دي بالظبط كاختيارات خاطئة (مشتتات) — معرفتك بيها بتديك ميزة مباشرة في الاختيار من متعدد.

الخارطة الذهنية للوحدات

٧

٠ الوحدة صفر → عمليات وترتيبها ← كسور (٤ عمليات) ← نسبة وتناسب ونسبة مئوية ← تحويلات ومساحات ومحيطات وحجوم ← سرعة وكثافة ← الآلة الحاسبة

١ الحساب → إشارات (جمع/طرح/ضرب/قسمة) ← قوى وجذور (قواعد الأسس) ← كسور ونسبة مئوية

٢ الجبر → متطابقات (وسّع) ← تحليل (اعكس التوسيع) ← معادلات ومتباينات (اعزل س)


٣ الهندسة الأساسية → زوايا (علاقات) ← فيثاغورس (مثلث قائم) ← مساحات ومحيطات (مستطيل/مثلث/ دائرة)

٤ الهندسة التحليلية → مسافة (طول) ← منتصف (نقطة وسط) ← ميل (اتجاه) ← توازي/تعامد (علاقة بين خطين)

٥ حساب المثلثات → جا/جتا/ظا (نسب) ← الزوايا الخاصة (قيم جاهزة) ← $\text{جا}^2 + \text{جتا}^2 = ١$ (علاقة أساسية)

كيف تستخدم الخريطة؟

قبل أي امتحان، غطي الملزمة وحاول ترسم الخريطة دي من ذاكرتك على ورقة فاضية — لو قدرت، يبقى الوحدة اتفهمت صح.



٨

بنك الأسئلة النهائي – اختيار من متعدد (امن ٢)

(٢) ٣٠% من ١٥٠ = ؟

(أ) ٣٠

(ب) ٤٥

(ج) ٥٠

(د) ٦٠

(١) $(٦-)\times(٢-)-(٣-)= ؟$

(أ) ١٥

(ب) ٩

(ج) ٩-

(د) ١٥-

(٤) بشرط: ٤س-٢(س-٣)

(أ) ٢س-٦

(ب) ٢س+٦

(ج) ٦س-٦

(د) ٦س+٦

(٣) $٦٨٢ = ؟$

(أ) ١٢

(ب) ٣٢

(ج) ٦٤

(د) ١٢٨

(٦) حل ٦س=٤٢ يعطي س=؟

(أ) ٦

(ب) ٧

(ج) ٨

(د) ٤٨

(٥) $(٢-س)(٢+س)= ؟$ (أ) $٤س^2$ (ب) $٤س^2+٤$ (ج) $٤س^2-٤س$ (د) $٤س^2+٤س+٤$

(٨) مثلث قائم ضلعا ٥ ، ١٢ — الوتر=؟

(أ) ١٣

(ب) ١٤

(ج) ١٥

(د) ١٧

(٧) حلل $٢١+س^2$ (أ) $(٣-س)(٧-س)$ (ب) $(٣+س)(٧+س)$ (ج) $(٣+س)(٧+س)$ (د) $(١-س)(٢١-س)$ (٩) مساحة دائرة نصف قطرها ١٤ $(٢٢/٧=ط)$

(أ) ٤٤

(ب) ٨٨

(ج) ٤١٦

(د) ٦١٦

(١٠) مجموع زاويتين متكاملتين = ؟

(أ) ٤٥° (ب) ٩٠° (ج) ١٨٠° (د) ٣٦٠°

(١٢) منتصف (٢,٦) و(٨,٢) = ؟

(أ) (٥,٤)

(ب) (٤,٥)

(ج) (٣,٤)

(د) (٦,٤)

(١١) ميل المستقيم المار بـ (١,٣) و(٤,٩) = ؟

(أ) ٢

(ب) ٣

(ج) ٤

(د) ٦

(١٣) المسافة بين (١,٠) و(٤,٤) = ؟

(أ) ٤

(ب) ٥

(ج) ٦

(د) ٧

(١٤) مستقيمان متوازيان لهما:

(أ) ميل متساو

(ب) حاصل ضرب ميلين = -١

(ج) نفس نقطة التقاطع

(د) لا علاقة بينهما

(١٥) جا $٥٥^\circ = ؟$

(أ) ١

(ب) $٢/٢\sqrt{}$ (ج) $٣/٢\sqrt{}$ (د) $١/٢$

٨

بنك الأسئلة النهائي – اختيار من متعدد (٢ من ٢)

(١٧) ظل $30^\circ = ?$

(أ) ١

(ب) $\frac{3}{4}$ (ج) $\frac{3}{4}\sqrt{3}$

(د) ٢

(١٦) جتا θ إذا جتا $\theta = \frac{5}{13}$ (حادّة) $= ?$ (أ) $\frac{12}{13}$ (ب) $\frac{13}{12}$ (ج) $\frac{5}{12}$ (د) $\frac{8}{13}$ (١٩) $(5 + s)^2 = ?$ (أ) $25 + s^2$ (ب) $25 + s + s^2 + 25$ (ج) $25 + s + s^2 + 25$ (د) $25 + s - s^2 + 25$ (١٨) $5^2 - ? =$

(أ) ٢٥

(ب) $25 -$

(ج) ١٠

(د) $1 -$ (٢١) محيط دائرة نصف قطرها ٢١ (ط $= \frac{22}{7}$)

(أ) ٤٢

(ب) ١٣٢

(ج) ١٣٨٦

(د) ٦٦

(٢٠) حل $2s - 5 = 9$ يعطي $s = ?$

(أ) ٢

(ب) ٥

(ج) ٧

(د) ١٤

(٢٢) مساحة مثلث قاعدته ١٢ وارتفاعه ٥

(أ) ١٧

(ب) ٣٠

(ج) ٦٠

(د) ١٢٠

(٢٣) مستقيمان متعامدان ميل أحدهما $\frac{1}{3}$ (أ) $\frac{1}{3}$

(ب) ٣

(ج) $3 -$ (د) $1/3 -$ (٢٥) جتا $60^\circ \times$ جتا 60° يبسط إلى:(أ) $\frac{3}{4}\sqrt{3}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$

(د) ١

(٢٤) $(-2)^{-3} = ?$

(أ) ٩

(ب) $9 -$ (ج) $1/9$ (د) $1/9 -$ (٢٧) مثلث زواياه $40^\circ, 40^\circ, 40^\circ$ (أ) 40° (ب) 60° (ج) 90° (د) 180° (٢٦) تحليل $25 - 2$ (أ) $(5 + 2)(5 - 2)$ (ب) $(5 - 2)^2$ (ج) $(25 - 2)^2$

(د) لا يُحلّل

(٢٨) $1/4 - 5/8 = ?$ (أ) $3/8$ (ب) $4/8$ (ج) $1/4$ (د) $1/8$

(٢٩) خط رأسي (عمودي على محور السينات) ميله:

(أ) صفر

(ب) غير معرّف

(ج) ١

(د) -1 (٣٠) جتا $90^\circ +$ جتا $0^\circ = ?$

(أ) ٠

(ب) ١

(ج) ٢

(د) -1

٨

بنك الأسئلة النهائي – مقالي ومسائل شاملة

أُسئلة مقالية (١٢ سؤال)

١) احسب: $(0-)\times(3-)+(12-)\div 4$ ٢) بسط: $(3س-2)-(س-0)$ ٣) وسع: $2(س+3)^2$ ٤) حلّ تحليلًا كاملًا: $س^2-6س+9$ ٥) حل المعادلة: $3(س-2)=س+4$ ٦) حل المتباينة: $س+3\geq 11$

٧) مثلث قائم ضلعا ٩، ١٢ — أوجد الوتر والمساحة

٨) مساحة ومحيط دائرة نصف قطرها ٢١ سم ($ط=22/7$)

٩) أوجد ميل ومنتصف القطعة الواصلة بين (٢،١) و (٨،٩)

١٠) أوجد معادلة المستقيم المار بـ (٠،٤) وميله -٢

١١) إذا $جا\theta=7/25$ (زاوية حادة) أوجد جتا θ وظا θ ١٢) بسط: $40جا + 30جتا - 60$

مسائل شاملة (٦ مسائل)

١) نقطتان أ (١،٢) و ب (٥،٨): أوجد طول أ ب، منتصفه، وميل المستقيم أ ب.

٢) مثلث قائم الزاوية ضلعا القائمان ٦ سم و ٨ سم: أوجد الوتر، ثم مساحة ومحيط المثلث كاملًا.

٣) سلعة سعرها الأصلي ٦٠٠ جنيه، زاد سعرها ٢٥%، ثم خُصم ١٠% من السعر الجديد. أوجد السعر النهائي، ونسبة التغير الكلية عن السعر الأصلي.

٤) دائرة نصف قطرها ١٠٥/٢٢ سم تقريبًا — استخدم $ط=22/7$ لإيجاد مساحتها ومحيطها، ثم قارن بينهما.

٥) في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزوايا الحادة ٣٠° والضلع المقابل لها ٥ سم. أوجد طول الوتر والضلع الآخر.

٦) مستقيمان: الأول يمر بـ (٠،١) وميله ٢، والثاني يمر بـ (٠،٥) وعمودي على الأول. أوجد معادلة المستقيم الثاني ونقطة تقاطع المستقيمين.

مفتاح إجابات بنك الأسئلة النهائي

٩

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
ب	ج	أ	أ	ب	أ	أ	ج	ب	ب
٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١
ج	ج	ب	ج	أ	ب	أ	ب	ب	ب
٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١
ب	ب	أ	ج	أ	أ	ج	ج	ب	ب

إجابات الأسئلة المقالية (١٢ سؤال)

- ١) $10 + (-3) = 7$
- ٢) $(3 - (-2)) - (-5) = 3 + 2 + 5 = 10$
- ٣) $(3 + 2)^2 = 5^2 = 25$
- ٤) $9 + 2(-3) = 9 - 6 = 3$
- ٥) $3(-2) = -6$ ، $4 + 2 = 6$ ، $1 = 1$ ، $0 = 0$
- ٦) $4 \leq 3 + 11 \leftarrow 4 \leq 14$ ، $8 \geq 2 - 3 \leftarrow 8 \geq -1$ (قسمة على سالب: اعكس الإشارة)
- ٧) وتر $= \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$ سم ، مساحة $= \frac{1}{2} \times 9 \times 12 = 54$ سم²
- ٨) مساحة $= \frac{1}{2} \times 22 \times 22 = 242$ سم² ، محيط $= 22 \times 2 + 22 \times 2 = 88$ سم
- ٩) ميل $= \frac{(-9) - (1 - 8)}{(2 - 8)} = \frac{-9 - (-7)}{-6} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$ ، منتصف $(0, 0)$
- ١٠) يمر بـ $(0, 4)$ وميله $-2 \leftarrow$ ص $= -2 + 4 = 2$
- ١١) جتا $= \frac{1 - (49/625)}{1} = \frac{576}{625}$ ، ظا $= \frac{24}{25}$ ، $7/24 = \theta$
- ١٢) $1 = 1/2 - 1/2 + 1$

إجابات المسائل الشاملة (٦ مسائل)

- ١) طول أ ب $= \sqrt{0.2} = \sqrt{2/10} = \sqrt{2}/\sqrt{10}$ ، منتصف $= (3, 0)$ ، ميل $= 3/2$
- ٢) الوتر $= 10$ سم ، المساحة $= 24$ سم² ، المحيط $= 24$ سم
- ٣) بعد الزيادة 20% : $70 \leftarrow$ بعد الخصم 10% : 170 جنيه ، نسبة التغير الكلية $= (170 - 70) / 70 \times 100 = 142.8\%$ زيادة عن السعر الأصلي
- ٤) بافتراض نق $= 10.0$ سم: المساحة $= 346.0$ سم² ، المحيط $= 66$ سم — المساحة أكبر رقميًا من المحيط هنا
- ٥) الوتر $=$ مقابل $\div$ ج $= 30 \div (1/2) = 60$ سم ، الضلع الآخر $= 10 \times 30 = 300$ سم
- ٦) المستقيم الثاني (عمودي، ميله $-1/2$ ، يمر بـ $(0, 0)$): ص $= -2/0 + 0$ ، نقطة التقاطع $= (0, 0)$

ولا تنسو الصلاة علي النبي ﷺ

بنك الأسئلة الشامل

11

١٠٠ سؤال شامل لكل وحدات الملزمة — للمراجعة النهائية

طريقة الاستخدام

البنك ده مقسم ٣ مستويات: ٥٠ سؤال اختيار من متعدد (أساسي)، ٣٠ سؤال مباشر (إجابة قصيرة)، و ٢٠ سؤال مستوى أعلى (يحتاج خطوات متعددة). حل كل مستوى لوحده، وراجع الإجابات في آخر البنك من غير ما تتلخبط.

⚠ تنبيه

ابدأ بالمستوى الأخضر ● لو حاسس إنك محتاج تراجع الأساسيات الأول، وابدأ بالأحمر ● مباشرة لو واثق من نفسك وعازر تتحدى مستواك.

المتميزون — ملزمة تأسيس الرياضيات

٤٣

بنك الأسئلة الشامل – القسم الأول (اختيار من متعدد) 1/3

١٢) $10 - 9 = ?$ (أ) ١ (ب) ٦ (ج) ٢٤ (د) ٢٤-

١) $(-8) + (-0) = ?$ (أ) ١٣- (ب) ١٣ (ج) ٣ (د) ٣-

١٤) $36 \div (-7) = ?$ (أ) ١ (ب) ٦- (ج) ٣٠ (د) ٣٠-

٣) $(-7) \times 11 = ?$ (أ) ٢٨- (ب) ٢٨ (ج) ١١ (د) ١١-

١٦) $0 \neq ?$ (أ) صفر (ب) ٠ (ج) ١ (د) غير معرّف

٥) $5^2 = ?$ (أ) ١٠ (ب) ٢٥ (ج) ٣٢ (د) ١٦

٨) $1/2 + 1/4 = ?$ (أ) ٢/٦ (ب) ٣/٤ (ج) ١/٦ (د) ٢/٤

٧) $8 \div 9 = ?$ (أ) ٨ (ب) ٩ (ج) ١٨ (د) ٤٠

١٠) $20\% \text{ من } 100 = ?$ (أ) ٢٠ (ب) ٣٠ (ج) ٣٥ (د) ٤٠

٩) $3/4 \times 2/3 = ?$ (أ) ١/٢ (ب) ٦/١٢ (ج) ٥/٧ (د) ٦/٧

١٢) ترتيب العمليات: $2 + 3 \times 4 = ?$ (أ) ٢٠ (ب) ١٤ (ج) ٩ (د) ٢٤

١١) $3^2 - 2 = ?$ (أ) ١/٩ (ب) ٩ (ج) ١/٩- (د) ٩-

١٤) محيط مستطيل طوله ٩ وعرضه ٤ = ؟ (أ) ١٣ سم (ب) ٢٦ سم (ج) ٣٦ سم (د) ١٨ سم

١٣) مساحة مربع طول ضلعه ٦ سم = ؟ (أ) ٢٤ سم^٢ (ب) ٣٦ سم^٢ (ج) ١٢ سم^٢ (د) ٣٠ سم^٢

١٦) ٣ كم = ؟ م (أ) ٣٠ (ب) ٣٠٠ (ج) ٣٠٠٠ (د) ٣

١٥) مساحة مثلث قاعدته ١٠ وارتفاعه ٦ = ؟ (أ) ٦٠ سم^٢ (ب) ٣٠ سم^٢ (ج) ١٦ سم^٢ (د) ٣٢ سم^٢

١٧) $500 \text{ سم}^2 = ? \text{ م}^2$ (أ) ٥ (ب) ٠,٠٥ (ج) ٥٠ (د) ٠,٥

بنك الأسئلة الشامل – القسم الأول (اختيار من متعدد) ٢/٣

(١٨) مجموع زاويتين متكاملتين = ؟ (أ ٤٥° ب ٩٠° ج ١٨٠° د ٣٦٠°)

❖ (۲۰) مجموع زوايا أي مثلث ؟ (ب) ۱۸۰° (ج) ۲۷۰° (د) ۳۶۰°

(٢٢) وسّع: $(س+٣)^2$ ؟ (ب) $س^2+٩س+٩$ (ج) $س^2+٩س+٦$
(٢٣) حُلّ: $٢٥-س^2$ أ) $(س-٥)^2$ (ب) $(س+٥)(س-٥)$ (ج) $(س-٥)(س+٥)$

(٢٤) حل: $10 = V + \text{س}$ (أ) $V = \text{س}$ (ب) $8 = \text{س}$ (ج) $22 = \text{س}$ (د) $9 = \text{س}$
(٢٥) حل: $3 = \text{س}$ (أ) $7 = \text{س}$ (ب) $V = \text{س}$ (ج) $18 = \text{س}$ (د) $73 = \text{س}$

٢٦) العامل المشترك الأكبر في ٩+٦؟ (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٦ (د) ٩

٢٨- $r^2 = ?$ أ) ٤ ب) ٤- ج) ٢ د) ٢- ٢٩- مساحة دائرة نق $v = (p = ٢٢/٧)$ أ) ٤٤ ب) ١٥٤ ج) ٢٢ د) ٤٩

٣٠. محيط دائرة نق=V (ط=٢٢/٧) أ) ٤٤ ب) ١٥٤ ج) ٢٢ د) ١٤

٣١. الوتر في المثلث القائم هو: أ) أقصر ضلع ب) أطول ضلع ج) أي ضلع د) الضلع الرأسي فقط

(٣٢) مثلث قائم ضلعا ٣,٤ — الوتر = ؟ (أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ١٢ **(٣٣)** ميل الخط الأفقي = ؟ (أ) غير معرّف (ب) ١ (ج) ٠ (د) ١-

٣٤) ميل الخط الرأسى = ؟ (أ) غير معرّف (ب) ١ (ج) ٠ (د) -١

بنك الأسئلة الشامل – القسم الأول (اختيار من متعدد) ٣/٣

- ٣٥) منتصف النقطتين (٢،٤) و (٦،٨) = (أ) (٤،٦) (ب) (٨،١٢) (ج) (٢،٤) (د) (٦،٤)
- ٣٦) المسافة بين (٠،٠) و (٣،٤) = (أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ٦ (د) ١٢
- ٣٧) توازي مستقيمين يعني: (أ) ميلاهما متساويان (ب) حاصل ضرب ميليهما = -١ (ج) لهما نفس نقطة التقاطع (د) لا علاقة بينهما
- ٣٨) تعامد مستقيمين يعني: (أ) ميلاهما متساويان (ب) حاصل ضرب ميليهما = -١ (ج) ميلاهما = صفر (د) لا علاقة بينهما
- ٣٩) جا٣٠° = (أ) ١/٢ (ب) ٢/٢٧ (ج) ٣/٢٧ (د) ١
- ٤٠) جتا٦٠° = (أ) ١/٢ (ب) ٢/٢٧ (ج) ٣/٢٧ (د) ١
- ٤١) جا٩٠° = (أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٢/٢٧ (د) غير معرّف
- ٤٢) جتا٩٠° = (أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٢/٢٧ (د) غير معرّف
- ٤٣) جا٩٠° + جتا٩٠° = (أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٥
- ٤٤) ظا٩٠° = (أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٣/٧ (د) غير معرّف
- ٤٥) ٢/٥ كنسبة مئوية = (أ) ٢٠% (ب) ٢٥% (ج) ٤٠% (د) ٥٠%
- ٤٦) عدد أضلاع متوازي الأضلاع = (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦
- ٤٧) حجم المكعب طول ضلعه ٣ سم = (أ) ٩ سم³ (ب) ١٨ سم³ (ج) ٢٧ سم³ (د) ٦ سم³
- ٤٨) السرعة = (أ) المسافة × الزمن (ب) المسافة ÷ الزمن (ج) الزمن ÷ المسافة (د) المسافة + الزمن
- ٤٩) الكثافة = (أ) الكتلة × الحجم (ب) الحجم ÷ الكتلة (ج) الكتلة ÷ الحجم (د) الكتلة + الحجم
- ٥٠) جذر ١٤٤ = (أ) ١١ (ب) ١٢ (ج) ١٣ (د) ١٤

بنك الأسئلة الشامل – القسم الثاني (أسئلة مباشرة) ١/٢

٥١ احسب: $4+9$ ٥٢ احسب: $3--10$ ٥٣ احسب: $7-x6$ ٥٤ احسب: 4^83 ٥٥ بسط: $1/3-0/1$

٥٦ احسب ١٥٪ من ٣٠٠

٥٧ حوّل ٢٥٠٠ م إلى كم

٥٨ مساحة شبه منحرف قاعدته ٦.١٠ وارتفاعه ٥

٥٩ محيط دائرة قطرها ١٤ (ط=٢٢/٧)

٦٠ بسط: $5س-3ص+2س+7ص$

٦١ وشع: (س-٤)(س+٤)

٦٢ حلّ: $س^2+7س+1٠$ ٦٣ حل: $2س+0=1٧$ ٦٤ حل المتباينة: $3س-2>1٠$

٦٥ مثلث قائم ضلعا ٩.١٢ — أوجد الوتر

المتميزون — ملزمة تأسيس الرياضيات

بنك الأسئلة الشامل – القسم الثاني (أسئلة مباشرة) ٢/٢

- ٦٦ زاويتان متكاملتان إحداهما 35° — أوجد الأخرى
- ٦٨ منتصف النقطتين (٠,٠) و (٨,٦)
- ٧٠ معادلة الخط بميل ٣ ويمر بـ (٠,٢)
- ٧٢ ظل 30°
- ٧٤ احسب حجم متوازي مستطيلات أبعاده $2 \times 3 \times 4$
- ٧٦ جسم كتلته ٥٠ جم وحجمه 10 سم^3 — كثافته؟
- ٧٨ حل نظام: $س + ص = ٧$ ، $س - ص = ١$
- ٨٠ مساحة متوازي أضلاع قاعدته ٨ وارتفاعه ٥
- ٦٧ ميل المستقيم المار بـ (١,٢) و (٥,١٠)
- ٦٩ المسافة بين (١,١) و (٤,٥)
- ٧١ جا 60°
- ٧٣ مثلث قائم: مقابل 6 ، وتر 10 — جا $\theta = ?$
- ٧٥ سيارة قطعت 180 كم في ٣ ساعات — سرعتها؟
- ٧٧ حلل بالتجميع: $س + ٢ = ٣ + ص + ٦$
- ٧٩ أكمل المربع: $س^2 + ٢س + ١$

المتميزون — ملزمة تأسيس الرياضيات

بنك الأسئلة الشامل – القسم الثالث (مستوى أعلى)

- ٨١ حل بالقانون العام: $s^2 - 5s + 6 = 0$
- ٨٢ حلل بإكمال المربع: $s^2 + 8s + 7$
- ٨٣ مستطيل محيطه ٢٦ سم وطوله يزيد عن عرضه بـ ٣ سم — أوجد البعدين
- ٨٤ مستقيمان متعامدان: أحدهما يمر بـ (٠,٢) و (٤,٢) — أوجد ميل الآخر
- ٨٥ مثلث قائم الزاوية، أحد ضلعيه ٧ والوتر ٢٥ — أوجد الضلع الآخر
- ٨٦ حل نظام: $s^2 + 3s = 13$ ، $s - 1 =$ (بالتعويض)
- ٨٧ بسط: $(3-s)^2 - (1+s)^2$
- ٨٨ إذا $\theta = 0/5$ و θ حادة، أوجد θ
- ٨٩ قطعة أرض مستطيلة مساحتها ٢٠٠ م^٢ وطولها ضعف عرضها — أوجد الأبعاد
- ٩٠ حلل: $s^2 + 6s - 12$
- ٩١ خزان أسطواني نق قاعدته ٧ م وارتفاعه ١٠ م — أوجد حجمه (ط=٢٢/٧)
- ٩٢ حل: $|s-2| = 6$
- ٩٣ سعر سلعة زاد ٢٠% ثم نزل ١٠% — ما نسبة التغير الكلية عن السعر الأصلي؟
- ٩٤ مثلثان متشابهان، أضلاع الأول ٣,٤,٥ وأكبر ضلع في الثاني ١٠ — أوجد باقي أضلاع الثاني
- ٩٥ أوجد المميز وعدد الحلول للمعادلة: $s^2 + 2s + 0 = 0$
- ٩٦ أوجد معادلة المستقيم المار بمتصف (٢,٤) و (٦,٨) وموازي للمستقيم $s = 2 - 1$
- ٩٧ مقياس رسم خريطة ١:٥٠٠٠٠ — المسافة على الخريطة ٤ سم، أوجد المسافة الحقيقية بالكم
- ٩٨ أوجد أعلى قيمة (أو أقل قيمة) للمقدار $s^2 - 4s + 7$ باستخدام إكمال المربع
- ٩٩ دائرتان متماستان خارجيًا نصف قطرهما ٥ سم و ٣ سم — أوجد المسافة بين مركزيهما
- ١٠٠ حل نظام ثلاث معادلات: $s + v + 7 = 6$ ، $s - v = 0$ ، $s^2 + 7 = v$ (وجه الحل باختصار)

مفتاح إجابات بنك الأسئلة الشامل – القسم الأول

١١) أ(٢٠ ب(٣٠ ج(٤٠ د(٥٠ هـ(٦٠ ز(٧٠ ح(٨٠ ط(٩٠ ي(١٠٠ ب

١٢) أ(١٢ ب(١٣ ج(١٤ د(١٥ هـ(١٦ ز(١٧ ح(١٨ ط(١٩ ي(٢٠ ب

١٣) أ(٢٢ ب(٢٣ ج(٢٤ د(٢٥ هـ(٢٦ ز(٢٧ ح(٢٨ ط(٢٩ ي(٣٠ ب

١٤) أ(٣٢ ب(٣٣ ج(٣٤ د(٣٥ هـ(٣٦ ز(٣٧ ح(٣٨ ط(٣٩ ي(٤٠ ب

١٥) أ(٤٢ ب(٤٣ ج(٤٤ د(٤٥ هـ(٤٦ ز(٤٧ ح(٤٨ ط(٤٩ ي(٥٠ ب

المتميزون — ملزمة تأسيس الرياضيات

مفتاح إجابات بنك الأسئلة الشامل – القسمان الثاني والثالث

9

● إجابات القسم الثاني (٥١-٨٠)

Ι/Γ (ΟΟ · ΛΙ (ΟΕ · ΕΓ (ΟΨ · ΙΛ (ΟΓ · Ο– (ΟΙ

(01 · ٤0 · 0٧) ٢,0 كم · (0٨ · ٤٠ سم² · 0٩) ٤٤ سم · (٦٠ · ٧ سم^٤ + ص

(٦١) $\text{س}^{-2} \cdot ١٦ \cdot (٦٢ + \text{س}) (\text{س} + ٢) (\text{س} + ٥) \cdot (٦٣ - \text{س}) = (٦٤ - \text{س}) \cdot (٦٥ - \text{س})$ ١٥ سم

٦٦ (٦٧ . ° ٥٥) ٦٧ . ٢ (٦٨ . ٤,٣) ٦٩ . ٥ (٧٠ . ٥) ص=س+٢

(٧١ - ٣ / ٢٧) (٧٢ - ٣ / ٣٧) (٧٣ - ٣ / ٥) (٧٤ - ٣ / ٨) سم^٣ . ٧٥ - ٦٠ كم/س

(٧٦) ٥ جم / سم^٣ (٧٧) (س+ص)(٢+ص) (٧٨) س=ε , ص=٣٠ (٧٩) (س+٦)^{-٢} (٨٠) ٤٠ سم^٢

● إجابات القسم الثالث (٨١-١٠٠)

(٨١) $\lambda = 3$ أو $\lambda = 2$ (س) $(\lambda + 1)(\lambda + 2) \cdot (\lambda + 3)$ الطول $\lambda = 0$ سم، العرض $0 = \text{سم}$

Γ=ص , ε=س (Λ٦ · Γ٤ (Λ٥ · Γ- (Λ٤

(٨٧) ٣س ٢-١٤س+ ٨٨٠ (٨٨) ٣/٤ (٨٩) الطول=٢٠م، العرض=١٠م

(٩٠) (٩٢+س) (٣-س) (٩١٠ ١٥٤٠ م ٩٢٠) س=٥ أ و س=١-

(٩٣ زيادة ٨ % ٩٤٠ ، ٦ ، ٩٥٠٠ المميز = ١٦ (سالب) — لا يوجد حل حقيقي

(٩٦) ص=٢س-٤٠ (٩٧) ٢ كم (٩٨) أقل قيمة = ٣ عند س=٢

(٩٩) $\wedge$ سم . ١٠٠ (ا = ص = س ، ع = 0

خَلِّصْتِ ١٠ سَوَآل شَامِل! دِلَوَقْتِي اِنْتِ جَاهِز فَعَلًا لِّى اِمْتِحَان تَأْسِيسِي



هل أنت جاهز للثانوي؟

١٠

التحدي الختامي

٢٥ سؤال خاطف من كل وحدات الملزمة. غطي شريط الإجابات تحت بإيدك وجاوب بسرعة من غير رجوع للصفحات — ده أصدق مقياس لمدى استعدادك فعلاً.

(١) أساسيات الحساب

$$(٢) \quad 3^4 \div 3^2 = ?$$

$$(١) \quad (-7) \times (-3) = ?$$

$$(٤) \quad 0.8 = ? \text{ (أصفر)}$$

$$(٣) \quad ١٥\% \text{ من } ٢٠٠ = ?$$

$$(٥) \quad 1/8 + 3/4 = ?$$

(٢) أساسيات الجبر

$$(٧) \quad \text{حل: } x^2 - ١٦$$

$$(٦) \quad \text{وشع: } (x+5)^2$$

$$(٩) \quad \text{بسط: } ٥س - (٣س - ٣)$$

$$(٨) \quad \text{حل: } ٣س - ٢ = ١٣$$

$$(١٠) \quad \text{حل المتباينة: } ٢س < ٦$$

(٣) الهندسة الأساسية

$$(١٢) \quad \text{مساحة مثلث قاعدته ١٤ وارتفاعه ٦}$$

$$(١١) \quad \text{مثلث قائم ضلعا ٦,٨ — الوتر = ?}$$

$$(١٤) \quad \text{محيط دائرة نق } V = (٢٢/٧) \text{ (ط)}$$

$$(١٣) \quad \text{مكقلة زاوية } ٤٠^\circ = ?$$

$$(١٥) \quad \text{مجموع زوايا أي مثلث = ?}$$

(٤) الهندسة التحليلية

$$(١٧) \quad \text{منتصف } (٢,٦) \text{ و } (٦,٢)$$

$$(١٦) \quad \text{ميل المستقيم بين } (٠,٠) \text{ و } (٤,٨)$$

$$(١٩) \quad \text{ميل عمودي على ميل ٤}$$

$$(١٨) \quad \text{المسافة بين } (٠,٠) \text{ و } (٦,٨)$$

$$(٢٠) \quad \text{ميل الخط الأفقي = ?}$$

(٥) حساب المثلثات

$$(٢٢) \quad \text{جتا } ٤٥^\circ = ?$$

$$(٢١) \quad \text{جا } ٣٠^\circ = ?$$

$$(٢٤) \quad \text{جا } ٣٠^\circ + \text{جتا } ٣٠^\circ = ?$$

$$(٢٣) \quad \text{ظا } ٦٠^\circ = ?$$

$$(٢٥) \quad \text{مثلث قائم: مقابل } ٦, \text{ وتر } ١٠ — \text{جا } \theta = ?$$

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)

جاوبت ٢٠ من ٢٥ صح من غير ما تفتح الملزمة؟ إنت جاهز للثانوي بثقة
أقل من كده؟ ارجع لوحدتك الضعيفة وذاكرها تاني — بالتوفيق

يا بطل

موقع الدكتور محمد رزق التعليمي



امسح الباركود بالمويل لتثبيت
التطبيق وتحميل كل الملازم مجاناً وبسرعه



حمل التطبيق الآن



كورسات ونتائج امتحانات



ملازم ثانوي



ملازم اعدادي



ملازم ابتدائي



موقع الدكتور محمد رزق
Dr. Mo. RIZK



D.M.RAZK

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء التعليمي